



臺南市登革熱疫情週報

2025/2/16—2025/2/22(Week 8, 2025)

(一)全國疫情

2025 年登革熱全國確定病例數：(1 月 1 日起，依發病日計)

■本土病例數：0

■境外移入病例數：32

(二)台南市疫情(第 8 週)

登革熱：

■新增 0 例本土病例

■新增 1 例境外移入

屈公病：

■新增 0 例本土病例


■新增 0 例境外移入

本市 2025 年至第 8 週
確定病例及同期比較(依發病日計)

發病年	登革熱			屈公病		
	本土	境外	總計	本土	境外	總計
2020	0	4	4	0	1	1
2021	0	1	1	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	1	1	0	0	0
2024	19	2	21	0	0	0
2025	0	1	1	0	2	2

登革熱國際間旅遊疫情建議

第一級(注意)：越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、斯里蘭卡、印度、新加坡



二、臺南市病媒蚊密度調查

2/16~2/22(第 8 週)病媒蚊密度調查共完成 198 里次


2/09~2/15(第 7 週)病媒蚊密度調查共完成 190 里次，級數分布如下：

級數 日期	★0 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
2/16-2/22 (第 8 週)	180 里次 (90.91%)	16 里次 (8.08%)	2 里次 (1.01%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)_	0 里次 (0%)
2/9-2/15 (第 7 週)	187 里次 (98.42%)	3 里次 (1.58%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)	0 里次 (0%)_	0 里次 (0%)
近 2 週 增減百分比	-7.51%	+6.5%	+1.01%	0%	0%	0%	0%

第 8 週：無 3 級里別

114年第03週至第08週臺南市人口監測區密度調查布氏級數3至6級比較圖

1



★請區公所針對 1 級以上里別加強民眾衛教 及孳生源清除。

三、臺南市監測區誘卵桶監測

目前監測 10 個監測區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、新營區、歸仁區） 271 里共 3,252 點。

★陽性點：119(陽性率 3.7%)

：連續兩週卵數>250 粒里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>40%里別，計 0 里

：連續兩週陽性率>60%里別，計 0 里


★監測日期：2025/2/16~2/22(第 8 週)

區別	里數	卵數>250 粒	里數	陽性率>40%	里數	陽性率>60%
中西區	0		0		0	
仁德區	0		0		0	
北區	0		0		0	
永康區	0		0		0	
安平區	0		0		0	
安南區	0		0		0	
東區	0		0		0	
區別						


南區	0		0		0	
新營區	0		0		0	
歸仁區	0		0		0	

四、臺南市 113 年與 114 年誘卵桶監測區同期比較

113年第51週至114年第8週臺南市監測區誘卵桶監測陽性率高於60%各區里數比較圖



臺南市監測區誘卵桶陽性率與平均卵數趨勢比較圖(113年與114年)



114年臺南市週平均溫度與累計雨量



致～市民防疫小叮嚀

- ★第8週本市監測區病媒蚊密度調查無達3級里別;登革熱防治中心將持續針對誘卵桶陽性率仍大於60%之里別進行複查，並提供環保局做為規劃預防性戶外環境防治參考。請里鄰長動員社區民眾清除積水容器，避免病媒蚊孳生；倘有疑似登革熱症狀請儘速就醫，避免潛伏期遭病媒蚊叮咬散播登革熱病毒於社區，造成疫情於環境中爆發。
- ★降雨後1週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查，並徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，留下的容器也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。
- ★本市自114年1月1日至3月31日止為勸導期，4月1日起，針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰新臺幣3,000～15,000元，無改善期。
- ★本市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁 <https://gov.tw/zv9> 或 06-3366366 防疫專線。

蚊媒傳染病點點名-1

登革熱 dengue fever



傳染途徑 埃及斑蚊 & 白線斑蚊

症狀 突發性高燒 ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹、嗜睡、躁動不安、肝臟腫大。

潛伏期 一般3至8天，最長14天。

必殺技 出血熱

如進展為登革熱重症，沒有及時就醫或治療，死亡率可以高達20%以上。

屈公病 Chikungunya Fever



傳染途徑 埃及斑蚊 & 白線斑蚊

症狀 發燒、頭痛、疲勞、噁心、嘔吐、肌痛、出疹、關節痛。

潛伏期 一般3至7天，最短2天，最長達12天。

必殺技 痛很久

持續數週的倦怠感，有些病患關節痛到無法行動，並持續數週或數月。

～請落實住家內(外)環境積水容器「巡、倒、清、刷」，以免孳生蚊蟲也避免受罰～