



臺南市政府登革熱防治中心

Center for Dengue Prevention and Control, Tainan City Government



2023
4月



本期目錄

■ 登革熱現況

□ 臺灣及臺南疫情現況

■ 專題報告

□ 臺南市政府衛生局防疫大使 席曼寧

□ T.O.C.C.問診

■ 病媒蚊密度調查

□ 病媒蚊密度調查

□ 陽性容器樣態分析



70256臺南市南區大同路二段752號之10

No. 752-10, Sec. 2, Datong Rd., South
Dist., Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.)


☎ 06-7030399

臺南市政府登革熱防治中心



112年登革熱疫情現況

台南市
本土 0例
境外 7例



縣市別	病例數
台中市	7
台南市	7
高雄市	7
台北市	6
桃園市	4
新北市	3
新竹市	2
新竹縣	1
台東縣	1
花蓮縣	1
屏東縣	1
苗栗縣	0
金門縣	0
南投縣	0
宜蘭縣	0
嘉義市	0
嘉義縣	0
彰化縣	0
澎湖縣	0
基隆市	0
連江縣	0
雲林縣	0
總計	40

【國際疫情】

- 112年國外疫情目前菲律賓、印尼及帛琉無更新資料，其餘國家病例數以**馬來西亞**最高，累計至5月2日共37,745(截至4月30日止31,111)例，其次為**菲律賓**29,885例。
- 112年與111年同期疫情相比，年同期疫情相比，各國病例人數均增加，其中增加最顯著的為**馬來西亞**，與111年相比增加25,035人。

臺南市政府衛生局防疫大使 席曼寧



登革熱宣導影片QR code

時序入夏，進入登革熱流行高峰，為提升登革熱相關知能及防治，臺南市政府登革熱防治中心特別邀請市長黃偉哲及與臺南有著深切情誼的知名演員席曼寧擔任登革熱防疫志工，協助拍攝宣導影片，並於5月8日在臺南市政府永華市政中心舉辦「感謝有“寧”登革熱宣導影片發布會」，一同帶領民眾認識登革熱，了解社區環境中的孳生源，於生活落實「巡、倒、清、刷」，也因台南水情嚴峻，透過宣導影片，教導民眾注意儲水方式避免病媒蚊孳生，提醒儲水容器加蓋，且每週徹底刷洗容器內壁一次，降低感染與傳播風險，齊心杜絕登革熱疫情，守護健康家園。

依據疾病管制署統計資料，全國登革熱境外移入病例已達36例，顯見隨著國境開放及檢疫放寬，國內登革熱流行風險日漸升溫，且今年東南亞地區登革熱疫情來勢洶洶，必須嚴加防範，呼籲民眾規劃出遊也應做好登革熱防疫措施，旅遊(出國)前做好居家環境積水容器清除及倒置，避免蚊蟲孳生，旅遊中注意防蚊措施，儘量穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露部位使用經衛生福利部核可的防蚊藥劑，避免遭受病媒蚊叮咬、旅遊(回國)後自主健康管理14天，如期間出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉/關節痛、出疹等症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史，以利醫師診治及通報衛生單位及早採取防治措施。

T.O.C.C.問診

厝邊好醫師 讓你真安心

請醫師看診時，落實TOCC問診，如發現自疫區返臺之民眾出現疑似症狀，

①請於24小時之內進行通報，②並連繫衛生單位收送檢體，以利後續相關防疫措施或撥打③登革熱防疫專線06-336-6366

後眼窩痛



肌肉關節痛



頭痛



出疹



發燒



使用NS1快篩試劑，縮短病例發現期

符合登革熱通報定義發病七日內、潛伏期內有國內外登革熱流行區活動史或住家範圍內有登革熱陽性病例之病患，可使用NS1快篩試劑，不論陽性或陰性，一律通報登革熱並保留血清檢體3ml送驗。



時序已進入登革熱及流感盛行季節且鄰近東南亞及南亞等國家登革熱疫情有上升趨勢，各縣市均有登革熱境外移入引發本土流行疫情之風險。籲請醫療院所**落實T O C C T：旅遊史、O：職業史、C：接觸史及C：群聚情形**問診並善用本市登革熱快篩試劑加強疑似登革熱病例通報警覺度以**降低登革熱流行風險**。如發現有發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等疑似症狀患者務必加強T O C C問診如遇疑似個案應儘速通報衛生單位以落實傳染病通報相關規定。

流感與登革熱初期的症狀，通常都會出現發燒、頭痛，典型流感則會出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛等症狀，又因登革熱初期症狀通常與典型流感出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛等症狀相似，致醫師常有誤診情況出現。故高雄市政府衛生局在此呼籲醫師們應提高警覺，如遇發燒症狀的疑似個案，應儘速通報，並運用「登革熱快篩試劑」協助鑑別診斷，以期早期發現個案，早期介入治療。

傳染病防治法第31條規定：「醫療機構人員於病人就診時，應詢問其病史、就醫紀錄、接觸史、旅遊史及其他與傳染病有關之事項；病人或其家屬，應據實陳述。」

【病媒蚊密度調查】

臺南市定期進行社區例行性病媒蚊監測，以瞭解各行政區及各里別病媒蚊數量變動狀況，並針對陽性處立即因地制宜執行各項的防治工作，降低危險。

本次分析期間為112年於本市37區衛生所、區公所進行監測，4月份查核770里次，調查結果如下：

調查單位	調查總里次	調查戶數	陽性戶	0級	1級	2級	3級以上
衛生所	770	39747	155	642	124	4	0



【陽性容器樣態分析】

112年台南市調查陽性容器數及陽性容器樣態1月份調查結果，以**桶、缸、甕、盆**佔多數(76.02%)為主，請民眾多加留意並做好積水容器之清除與管理，落實清除孳生源才是登革熱防治之根本。

種類	花瓶	各式底盤	水溝	水塔 冷卻水塔	帆布 塑膠布	桶、缸 甕、盆	保利龍 箱盤、塑 膠籃	馬桶 水箱	杯瓶碗 罐盒	地下室 防空洞	輪胎	其他
4月份 陽性容器	5	8	0	2	2	130	1	1	15	0	0	7
百分比	2.92%	4.68%	0%	1.17%	0%	76.02%	0.58%	0.58%	8.77%	0%	0%	4.09%

*陽性容器其他：

金爐、地面積水、旗座、澆花器、鍋具、造景、塑膠袋、地面凹洞、桶蓋、管洞、椅子、樹洞、畚箕、紐澤西護欄、水錶箱、洗手台、洗衣機、水瓢。

* * * 隨手清除積水容器 小小動作 自己安心 別人放心 * * *

提醒市民

梅雨季節即將到來，劇烈降雨易使得戶內外積水容器增加，恐孳生大量病媒蚊，加上今年境外移入登革熱病例數為去年同期兩倍以上，在境外移入登革熱病毒風險攀升且病媒蚊密度驟增情形下，登革熱疫情可能一觸即發，臺南市政府呼籲民眾應儘速清除家戶內外積水容器，避免爆發本土登革熱疫情。請民眾持續每週巡查居家環境，做好「巡、倒、清、刷」，清除積水容器，並做好防蚊措施。

登革熱辦辦！

雨後加強孳清 讓病媒蚊絕跡

 <h1>巡</h1> <p>積水容器、水溝</p>	 <h1>倒</h1> <p>容器倒置</p> 
 <h1>清</h1> <p>清除積水、不要的容器</p>	 <h1>刷</h1> <p>刷掉蟲卵</p>

自112年4月1日起，本市公、私場所之所有人、管理人或使用人應主動清除場所內之登革熱病媒蚊孳生源，一經查獲病媒蚊孳生源，將依傳染病防治法第25條及依同法第70條規定，逕行舉發並處三千元以上一萬五千元以下罰鍰。

提醒市民

民眾如規劃至東南亞及南亞國家(柬埔寨、印度、印尼、

寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新

加坡、斯里蘭卡、泰國、越南)探親旅遊時，

■出國前 需清除居家積水容器避免孳生病媒蚊。

■出國中 需做好防蚊措施，使用合格防蚊液，穿著淺色長袖衣褲。

■返國後 14天內做好自主健康管理。

未避免病毒於社區擴散，如發現疑似症狀時請立即就醫，主動告知醫師相關旅遊史，以利及早診斷治療與防治，降低社區感染風險。提醒民眾，登革熱快篩為初步篩檢，快篩陰性時仍不可輕忽，請在家中多休息，待衛生單位通知實驗室完整報告，才可研判有無感染登革熱。

阻絕境外

出國旅遊疾病不帶回國

- 旅遊史 Travel history
- 職業別 Occupation
- 接觸史 Contact history
- 群聚史 Cluster

出國前

請確實做好居家環境檢查
「不」對不留

旅遊中

應做好防蚊措施，
正確使用衛福部許可
含DEET或Picaridin
防蚊藥劑，
著淺色長袖衣褲

回國後

從流行地抵台後二周內有發燒
(38°C到40°C) 或惡寒、皮膚出疹、
四肢痠痛、頭痛、後眼高痛、關節痛
或肌肉痛等症狀請盡速就醫，
落實「TOCC」機制，
醫師應確實詢問並記錄
及民眾須主動告知

快快篩·快快好

<https://reurl.cc/yyNKga>

臺南市NS1合約院所名單請至臺南市政府登革熱防治中心網站查詢

民眾疫情通報及關懷專線 1922
臺南市政府登革熱防治中心防疫專線 3366366

臺南市政府登革熱防治中心 關心您