



臺南市政府登革熱防治中心

Center for Dengue Prevention and Control, Tainan City Government



2023
10月



本期目錄

■登革熱現況

□ 臺灣及臺南疫情現況

■專題報告

- 黃偉哲市長帶領南市府全員出動戮力投入登革熱防疫工作，全力遏止疫情擴散！
- 登革熱防治中心鼓勵民眾可運用DIY製作簡易產卵誘集桶等各式防蚊工具，多管齊下消滅病媒蚊！
- 歸仁區出現第二型登革熱，有高雄足跡，請民眾盡速進行孳生源清除，以防感染不同型別增加罹病嚴重度。

■陽性容器樣態分析



70256臺南市南區大同路二段752號之10

No. 752-10, Sec. 2, Datong Rd., South ☎06-7030399


Dist., Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.)

臺南市政府登革熱防治中心



112年登革熱疫情現況

類別	本土	境外
全國	20,853	210
台南市	18,344	30




【國際疫情】

- 境外移入病例主要以東南亞國家為主，泰國53例、越南51例、馬來西亞28例、印度尼西亞26例、菲律賓16例、印度13例、新加坡6例、寮國5例、馬爾地夫5例、柬埔寨、中國各3例、孟加拉、緬甸各1例。

資料來源：衛生福利部疾病管制署

黃偉哲市長帶領南市府全員出動戮力投入登革熱防疫工作，全力遏止疫情擴散！



為一股作氣消滅病媒蚊，讓登革熱確診病例數儘快下降，南市府由上至下各局處全員出動，加緊腳步戮力投入各項防疫行動，因應近期防疫強度增強，化學防治及強力孳清場次增多，衛生局所人員全力執行化學防治作業，南市登革熱稽督大隊則負責進行家戶強力孳清作業，其他確診病例數較少之行政區則調度支援高風險行政區執行各項防疫工作，每日皆出動500人以上執行登革熱相關防疫任務，各局處盤整所有人力、物力資源，通力合作、齊心協力為對抗登革熱努力，黃偉哲市長亦身先士卒投入防疫行列，時常與第一線防疫同仁共同站在最前線，深入各社區督導化學防治及孳清作業執行，亦與基層防疫同仁一同扛起沉重的噴槍執行社區噴藥任務，以身作則展現南市府對抗病媒蚊決心，為保護所有市民健康努力。黃偉哲市長表示，近期雖確診病例數持續下降中，但氣溫依然適合病媒蚊生長，惟有落實孳清再孳清，降低社區中病媒蚊孳生源才能釜底抽薪減少病媒蚊數量，遏止登革熱疫情蔓延擴散，而現在正是疫情的最後關鍵期，黃偉哲市長再次呼籲，登革熱是一種環境病、社區病，單靠政府力量有限，但民力無窮，籲請所有市民朋友即刻投入登革熱防疫行列，家家戶戶共同落實「巡、倒、清、刷」，登革熱防疫由生活中做起，共同為保衛臺南健康家園努力。

登革熱防治中心蘇世斌主任也強調貫徹公權力的決心，截至10月27日為止，登防中心共開立538張罰單，其中534件是家戶孳生病媒蚊、4件為拒絕化學防治。蘇主任呼籲民眾務必加強孳生源清除及配合相關防疫措施，以免違反傳染病防治法被罰。他也提醒雖天氣轉涼，請市民朋友切勿鬆懈仍應做好自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經政府機關核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535(伊默克)等有效成分之防蚊藥劑，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，切勿自行服用成藥，應儘快就醫接受登革熱快篩，避免登革熱持續擴散，盼在各界共同努力下疫情能儘快結束。

黃偉哲市長籲請所有市民朋友，防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，澈底落實「巡、倒、清、刷」，將登革熱防疫觀念內化為日常生活中的一部分，從根本杜絕病媒蚊孳生，並持續配合市府防疫措施，才能儘快將登革熱疫情控制，攜手齊心守護臺南健康家園。

登革熱防治中心鼓勵民眾可運用DIY製作簡易產卵誘集桶等各式防蚊工具，多管齊下消滅病媒蚊！



日前登革熱防治中心汲取專家建議，於先前安南區確診病例數較多之溪墘里、幸福里、安富里及海佃里帶領社區志工，運用黑色育苗軟盆、飲料胖胖杯、黏蟲紙、16目紗網及各式工具等製作簡易產卵誘集桶共4000個，發放給里民們自行放置於家戶內外病媒蚊易躲藏地點，透過水氣吸引雌蚊前來產卵，進而透過桶壁黏膠加以誘捕，達到降低社區病媒蚊密度效果，近期防治中心亦陸續再回到社區中，為家戶更換簡易產卵誘集桶桶壁黏膠，以供繼續使用，並同時分析誘捕病媒蚊成效，經抽查安富里21個、溪墘里30個、幸福里52個及海佃里46個，共149個簡易產卵誘集桶，109個放置於室內、40個放置於室外，其中18個有誘捕到病媒蚊，總計陽性率為12%，經調查上述簡易產卵誘集桶放置位置，發現最常誘捕到病媒蚊的前幾名地點為車庫、庭院、門口及廚房，登革熱防治中心蘇世斌主任說明，病媒蚊習性喜歡躲藏於家戶內外陰暗處，如衛浴廁、廚房與客廳角落，及上述車庫、庭院和門口等，雖然現在天氣已逐漸轉涼，但依然適合病媒蚊生長，提醒民眾仍應加強自身防蚊措施，除可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處塗抹經政府機關核可之防蚊藥劑外，亦可透過各式防蚊工具如捕蚊燈、電蚊拍、防蚊掛片或是DIY製作簡易產卵誘集桶等方式，多管齊下消滅家中病媒蚊成蚊，再結合家戶內外巡檢孳清，清除積水容器，將病媒蚊成蚊和幼蟲趕盡殺子、一網打盡。

蘇世斌主任亦持續提醒，因本市流行的第一型登革病毒症狀較不明顯，請市民務必提高警覺，如有發燒、頭痛、眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀應儘速就醫，勿自行服用成藥，本市37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所皆有提供登革熱快篩採檢服務，請有疑似登革熱症狀的市民應儘速主動前往接受篩檢。

黃偉哲市長籲請所有市民朋友，防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，澈底落實「巡、倒、清、刷」，將登革熱防疫觀念內化為日常生活中的一部分，從根本杜絕病媒蚊孳生，並持續配合市府防疫措施，才能儘快將登革熱疫情控制，攜手齊心守護臺南健康家園。

歸仁區出現第二型登革熱，有高雄足跡，請民眾盡速進行孳生源清除，以防感染不同型別增加罹病嚴重度。



南市目前正處於疫情下降期之關鍵階段，市府所有人員不分局處、單位皆戮力投入登革熱防疫行列，病例數較少之冷區亦跨區支援病例數較多之熱區，所有同仁不分你我，一同執行孳清、稽查、化學防治等各項防疫任務，為持續降低南市每日確診病例數及保衛所有市民健康努力。惟近日登革熱防治中心疫情監測分析顯示，原本確診病例數較少之冷區確診病例佔總病例數之比率有增加趨勢。疾病管制署機動防疫隊和登革熱防治中心至上述冷區執行孳生源稽查時，亦於家戶花盆及底盤、建築工地、社區髒亂點、空屋及空地等高風險點查獲積水孳生病媒蚊幼蟲，黃偉哲市長亦相當關心此訊息，於召開南市一級登革熱流行疫情指揮中心會議時，特別提醒雖然天氣逐漸轉涼，但南部地區氣候仍適宜病媒蚊生長，並責成市府各機關、區公所及衛生所皆應提高警覺切勿輕忽，星星之火足以燎原，應儘快加強各區轄內高風險處所孳生源巡檢和稽查作業，徹底找出社區中隱藏孳生源並加以清除，讓病媒蚊子無處孳生。

登革熱防治中心蘇世斌主任亦提醒，請市民朋友如有發燒、頭痛、眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀，切勿自行服用成藥，應儘速就醫接受登革熱快篩採檢；另籲請臺南市所有區域之醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有不明原因發燒或上述疑似症狀，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中蔓延擴散。

防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。其中歸仁有一例經病毒分型結果為第二型，與台南市流行的第一型不同，經疫調結果有高雄足跡，請市民把握防疫時效，盡速進行孳生源清除，以防感染不同型別增加罹病嚴重度。

黃偉哲市長籲請所有市民朋友，防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，澈底落實「巡、倒、清、刷」，將登革熱防疫觀念內化為日常生活中的一部分，從根本杜絕病媒蚊孳生，並持續配合市府防疫措施，才能儘快將登革熱疫情控制，攜手齊心守護臺南健康家園。

【陽性容器樣態分析】

臺南市定期進行社區例行性病媒蚊監測，截至11/1合計共查核836場，動員84,343人次、調查429,219戶、查獲1,836間陽性戶、95,168個積水容器、2,295個陽性容器並完成清除，衛教245,974人次。

日期區間	場次	動員人次	調查戶數	陽性戶數	積水容器	陽性容器	衛教人數
6月11日-10月25日	749	79,286	402,027	1,809	88,845	2,262	218,505
10月26日-10月29日	53	3,469	16,140	15	3,734	20	17,187
10月30日-11月1日	34	1,588	11,052	12	2,589	13	10,282
合計	836	84,343	429,219	1,836	95,168	2,295	245,974



**** 感染登革熱，沒症狀者是有症狀者的4倍 ****

**** 沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱 ****

**** 抓準斑蚊的習性，清除室內外孳生源是重點 ****

**** 開罰是手段，您的健康才是我們的目的 ****

*陽性容器其他：

金爐、地面積水、旗座、澆水器、鍋具、造景、塑膠袋、地面凹洞、桶蓋、管洞、椅子、樹洞、畚箕、紐澤西護欄、水錶箱、洗手台、洗衣機、水瓢。

提醒市民

防治登革熱小教室



如何正確使用防蚊液【上】

《避免蚊子叮咬，減少登革熱感染風險》



選購合格產品

- 有政府主管機關核可，可使用於人體裸露之皮膚的防蚊藥劑。




噴灑時保持距離

- 使用時要距離皮膚或衣物10~15公分，並緩慢噴灑



先防曬再防蚊液

- 先擦防曬，等5~10分鐘乾燥，再用防蚊液，避免過敏不適



防治登革熱小教室



如何正確使用防蚊液【下】

《避免蚊子叮咬，減少登革熱感染風險》



避免眼口鼻及傷患處

- 先噴於手掌再塗抹臉部，小心避開眼、口周圍，以及有傷口、過敏或曬傷部位
- 孩童使用時，避免塗抹或噴灑在手部，以免孩童接觸眼口鼻而誤食



注意孩童適用年齡

- 敵避適用在2個月以上的孩童，建議使用濃度為10%至30%
- 派卡瑞丁適用在2歲以上的兒童

2個月以上
敵避(DEET)

2歲以上
派卡瑞丁(Picaridin)



提醒市民



當登革熱遇上大雨



夏季氣候不穩，午後雷雨或颱風降雨，讓積水容器成為病媒蚊的溫床。

四字滅蚊大法

巡

· 巡視家中積水容器

倒

· 清掉家中積水容器

清

· 清除廢棄物容器

刷

· 刷除殘留蟲卵



2023. 08. 01

登革熱 緊急噴藥 注意事項

1 收妥

食物
餐具
衣物

2 密閉

電源
瓦斯
大樓偵煙器

3 保護

魚缸務必加蓋
關閉打氣電源
寵物帶至戶外

4 密閉

噴藥後，門窗
緊閉60分鐘
人員勿入內

5 通風

密閉後，開門窗
通風30分鐘
注意地板濕滑

6 清潔

用抹布沾清潔劑
或直接以清水擦
拭清除藥劑



2023. 08. 02

提醒市民



防治登革熱小教室

我家前幾天才噴過藥，為什麼還要再噴？

■ 鄰近100公尺新增登革熱確診病例

- 發生群聚病例時會劃定大區塊範圍，由外向內包抄噴藥夾殺帶病毒斑蚊

■ 除蟲菊精不殘留

- 室內噴藥瞬間擊殺成蚊，噴完一小時後，打開門窗通風後藥效即散去

■ 避免斑蚊竄逃至你家

- 由外向內包抄噴藥時，斑蚊會往沒有噴藥的地方竄逃



《感謝每一位市民對噴藥的配合以及對產生不便的體諒，才讓疫情控制下來》



謝謝您的
體諒配合

病媒孳生源之公、私場所，其所有人、管理人或使用人，未依通知或公告主動清除，將依法罰鍰3,000元至15,000元

任何角落 子不放過

積水養蚊，小心開罰！



蚊蟲誘殺桶DIY

準備道具

黑色育苗軟盆 1個
水 600ml
飲料胖胖杯 2個
黏蟲紙 1份
紗網 16目 (面積需大於杯口)
筆
剪刀
美工刀
尺

步驟1



蚊蟲誘殺桶DIY

將黏蟲紙裁成
合適大小(21×6cm)

步驟2



蚊蟲誘殺桶DIY

倒置裁好的飲料杯
於切口處擺上紗網
與另一完整飲料杯
交疊後上下轉正

步驟3



蚊蟲誘殺桶DIY

步驟4



清水沿杯壁
緩慢倒入杯中
水位與紗網齊平

蚊蟲誘殺桶DIY

步驟5



將黏蟲紙撕開
圍成圓圈放入杯中

蚊蟲誘殺桶DIY

步驟6
完成



將育苗軟盆倒放
蓋住飲料杯