


112 年度臺南市校園流感接種流程



附件一

*警語：持用本資料，應依據個人資料保護法之相關規定，審慎處理及保護個人資訊。(匯出時間：民國YYY/MM/DD HH/MM/SS；匯出單位：%UnitName%)

111 年度 新北市 校園流感疫苗接種現場輔助表單

可做為接種現場之輔助表單 請依實際需求自行運用

學校：市立新店高中

科系：應用外語科(英文組)

姓名：王大明

學制：實用技能學程

年級班級：1 年 3 班

身分證號：A123456789

日夜別：日間部

座號：1 號

出生年月日：99/10/10

接種意願：同意接種

接種日期：%YYY%年 %MM%月 %DD%日

合約院所：%合約院所名稱%

接種當日體溫： _____ (°C)

當日因故未接種季節性流感疫苗原因：

發燒

生病

請假

因故欲自行至校外接種

其他 _____

家長簽名：



醫師簽章：

接種護理人員簽章：

附件二

臺南市學校學生流感疫苗注意事項			
學 校	年 班	學童姓名	
評估日期	年 月 日	體 溫	°C
醫師評估 結 果	<input type="checkbox"/> 不可接種，原因：		
評估醫師 簽 章		醫療院所名稱	

【接種注意事項】

- 一、 流感疫苗是一種相當安全的不活化疫苗，接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，但一般均於接種後一到兩天內恢復，嚴重的副作用則極少發生。
- 二、 接種流感疫苗後 48 小時內約有 1-2%可能有發燒反應，應告知醫師曾經接種過流感疫苗以作為鑑別診斷的參考。接種 48 小時後仍持續發燒時，應考慮可能另有其他感染或發燒原因。
- 三、 接種後如有持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫，並通報學校班導師/護理人員，或撥打下列諮詢專線，將有專人為您服務。
- 四、 暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，出現眩暈與噁心等症狀，大多發生於青少年集體接種疫苗時。大規模疫苗接種時，偶會發生聚集性暈針現象，被稱為集體心因性疾病。暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康的後遺症。倘若學生於回家後暈針現象持續，宜送醫診治。
- 五、 完成疫苗接種後，雖可降低感染流感的機率，但仍有可能罹患其他非流感病毒所引起的呼吸道感染，請注重個人衛生保健及各種預防措施，以維護身體健康。
- 六、 使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少 2 分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
- 七、 貴子女如為出生後首次接種流感疫苗之國小二年級以下學童，如有自覺需要，可於第一劑接種至少四週後，至醫療院所自費接種第二劑。
- 八、 **如因其他原因無法集中接種，請於收到校方補接種通知單後，攜帶補接種通知單至合約院所接種疫苗。**

臺南市政府衛生局敬啟

_____學校諮詢專線：_____

衛生局諮詢專線：(06)2880180

疾病管制署疫情通報及諮詢專線：1922