

# 臺南市 111 年護理人員公開甄選試題

111.8.28

- 本試題為雙面印刷，共 50 題，每題 2 分，皆為單選題，請選出一個正確或最適當的答案，答錯不倒扣；複選作答者，該題不予計分。
  - 須用 2B 鉛筆在答案卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
  - 禁止使用電子計算器
1. 臺南市政府衛生局提供本市低收、中低收入戶兒童免費口服輪狀病毒疫苗接種服務，下列敘述何者不正確？
- (A)實施對象：具低收、中低收入戶身分，設籍於臺南市且出生未滿 6 個月之幼兒。
  - (B)接種時程與間隔：出生滿 6 週至 4 個月內接種第 1 劑，出生 6 個月內完成第 2 劑接種，兩劑之間至少間隔 4 週。
  - (C)接種地點：臺南市各級醫療院所。
  - (D)此政策旨在降低臺南市嬰幼兒受感染之威脅，實踐照顧弱勢家庭嬰幼兒健康之理念。
2. 關於 108 年 7 月 1 日（含）以後出生且母親為 B 型肝炎表面抗原陽性之新生兒，下列敘述何者正確？
- ①於出生 3 天內儘速接種 1 劑 HBIG 及第 1 劑 B 型肝炎疫苗。
  - ②於出生 24 小時內儘速接種 1 劑 HBIG 及第 1 劑 B 型肝炎疫苗。
  - ③實施對象滿 12 個月大時，檢測其 B 型肝炎表面抗原及表面抗體。
  - ④實施對象滿 6 個月大時，檢測其 B 型肝炎表面抗原及表面抗體。
- (A)①③
  - (B)②③
  - (C)①④
  - (D)②④
3. 關於國內幼兒接種活性減毒疫苗之政策，下列敘述何者不正確？
- (A)含麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)、水痘疫苗及日本腦炎疫苗等三項。
  - (B)儘可能安排同時間分開不同部位接種，以避免發生間隔不足誤失。
  - (C)活性減毒疫苗如未能同時接種，兩種疫苗應至少間隔 2 週(14 天)再接種。
  - (D)如有接種間隔不足，後一劑疫苗應進行補種，以避免該劑疫苗之免疫效果受干擾。

4. 臺南市政府衛生局關懷訪視員，提供問題較複雜、需更高密度關懷的精神病人專責服務，下列敘述何者不正確？
- (A)以電話訪視及家庭訪視為主。
  - (B)透過訪視病人及其家屬瞭解病人精神狀況、病情變化、有無定期回診及按時服藥等。
  - (C)提供諮詢及衛教家屬有關精神疾病的照護及給予心理上的支持。
  - (D)幫助建立病人之病識感，讓病人更能接受機構式照護。
5. 臺南市政府毒品危害防制中心提供各項諮詢及戒治服務，所提供的 24 小時毒品防制諮詢專線為：
- (A)0800-880-900。
  - (B)0800-000-123。
  - (C)0800-111-113。
  - (D)0800-770-885。
6. 依據中華民國糖尿病學會 2020 年糖尿病照護指引，對於非懷孕成年人糖尿病的治療目標，下列敘述何者不正確？
- (A)餐前血糖 80-100 mg/dL。
  - (B)低密度脂蛋白膽固醇 <100 mg/dL。
  - (C)餐後 2 小時血糖 <160mg/dL (高峰)。
  - (D)糖化血色素 <7.0 (需個別化考量)。
7. 關於臺南市市民參加「行動醫院、全民健檢」的篩檢條件，下列敘述何者不正確？
- (A)具原住民身份者，40 歲至 54 歲每 3 年 1 次，55 歲以上每年 1 次。
  - (B)65 歲以上市民，每 2 年免費檢查 1 次，40~64 歲市民，每 5 年免費檢查 1 次。
  - (C)35 歲以上領有小兒麻痺證明者，每年 1 次。
  - (D)自行前往醫院或診所做過成人健檢民眾與不確定是否符合資格做檢查之民眾，可拿健保卡先至衛生所查詢是否符合資格。
8. 臺南市政府於 109 年推動「失智防治行動方案」，關於此方案期待至 2025 年達成的目標，下列敘述何者正確？
- (A)失智家庭照顧者有 5 成以上獲得支持和訓練。
  - (B)本市民眾有 14%以上對失智症有正確認識及友善態度。
  - (C)罹患失智症的人口有 7 成以上獲得診斷及服務。
  - (D)以上皆是。

9. 關於 111 年衛生福利部國民健康署所推行的「肺癌早期偵測計畫」，下列敘述何者正確？
- (A) 提供有肺癌風險因子且具健保身分之民眾，每 3 年 1 次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查。
  - (B) 服務對象之一為：具肺癌家族史：50 至 74 歲男性或 45 至 74 歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。
  - (C) 排除對象為具重度吸菸史：50 至 74 歲吸菸史達 30 包/年以上，有意願戒菸，或戒菸 15 年內之重度吸菸者。
  - (D) 以上皆是。
10. 世界無菸日是每年的幾月幾日？
- (A) 5 月 31 日。
  - (B) 3 月 21 日。
  - (C) 8 月 18 日。
  - (D) 9 月 15 日。
11. 液態搖頭丸(Liquid Ecstasy、Georgia Home Boy)屬於：
- (A) 第一級毒品。
  - (B) 第二級毒品。
  - (C) 第三級毒品。
  - (D) 第四級毒品。
12. 依據衛生福利部食品藥物管理署 110 年 1-4 月學生藥物濫用統計，和 109 年 1-4 月比較，下列敘述何者不正確？
- (A) 學生藥物濫用人數減少。
  - (B) 學生以第二級毒品施用人數增加。
  - (C) 學生以第四級毒品施用人數增加的百分比為最高。
  - (D) 以國中生施用毒品人數增加為最多。
13. 依據衛生福利部提供的預防牙周病宣導資料，全民健保給付 13 歲以上民眾，每隔多久洗牙一次？
- (A) 3 個月。
  - (B) 6 個月。
  - (C) 9 個月。
  - (D) 12 個月。

14. 關於 HPV 疫苗二價疫苗接種，下列說明何者正確？
- (A)9-14 歲接種 3 劑型、15 歲以上接種 2 劑型。
  - (B)9-14 歲施打第二劑和第一劑間隔 5 個月(150 天起)至 13 個月(390 天止)之間施打。
  - (C)15 歲以上施打第二劑和第一劑間隔 5 個月(150 天起)至 13 個月(390 天止)之間施打。
  - (D)15 歲以上施打第二劑和第一劑間隔 1 週(7 天)。
15. 我國對於食品產銷過程，針對可能產生的危害加以分析，設置重點管制點以嚴格監控，所推動的制度為？
- (A)CAS。
  - (B)GMP。
  - (C)GDP。
  - (D)HACCP。
16. 有關常用的死亡統計公式，下列敘述何者不正確？
- (A)嬰兒死亡率：一年內出生未滿 1 歲嬰兒死亡數/該年出生之活嬰總數 $\times 1000$ 。
  - (B)新生兒死亡率：一年內出生未滿 4 週之嬰兒死亡數/該年出生之活嬰總數 $\times 1000$ 。
  - (C)周產期死亡率：出生滿 7 天內之新生兒死亡數/該年出生之活嬰總數 $\times 1000$ 。
  - (D)孕產婦死亡率：一年內由於各種產褥原因所致孕產婦死亡數/該年出生之活嬰總數 $\times 100000$ 。
17. 依據「2020 年版美國心臟協會(AHA)心肺復甦術和心血管緊急照護指引(CPR & ECC Guidelines)，OHCA 時的「生存之鏈」，下列順序何者正確？
- (A)①緊急應變系統啟動②高品質 CPR③去顫④高級心肺復甦⑤心臟停止後照護⑥復原
  - (B)①高品質 CPR②緊急應變系統啟動③去顫④高級心肺復甦⑤心臟停止後照護⑥復原
  - (C)①高品質 CPR②高級心肺復甦③去顫④緊急應變系統啟動⑤復原⑥心臟停止後照護
  - (D)①緊急應變系統啟動②高品質 CPR③去顫④高級心肺復甦⑤復原⑥心臟停止後照護
18. 目前我國 COVID-19，下列哪位確診者得採居家照護？
- (A)確診者年齡為 65-69 歲：無症狀或輕症，獨居。
  - (B)確診者年齡為 <3 個月：血氧飽和度 92%。
  - (C)確診者年齡為 30 歲：無症狀或輕症，懷孕  $\geq 36$  週。
  - (D)確診者年齡為 11 個月：體溫 38 度，無症狀或輕症。

19. 依據衛生福利部疾病管制署「受聘僱外國人健康檢查管理辦法」，第二類外國人申請入國簽證時，應檢具認可醫院核發之三個月內健康檢查合格證明檢查項目除一般身體檢查外，尚包含？
- (A)胸部 X 光肺結核檢查、漢生病檢查、梅毒血清檢查、腸內寄生蟲糞便檢查、麻疹及德國麻疹之抗體陽性檢驗報告或預防接種證明。
  - (B)胸部 X 光肺結核檢查、梅毒血清檢查、麻疹及德國麻疹之抗體陽性檢驗報告或預防接種證明。
  - (C)胸部 X 光肺結核檢查、漢生病檢查、腸內寄生蟲糞便檢查、麻疹及德國麻疹之抗體陽性檢驗報告或預防接種證明。
  - (D)胸部 X 光肺結核檢查、梅毒血清檢查、腸內寄生蟲糞便檢查、麻疹及德國麻疹之抗體陽性檢驗報告或預防接種證明。
20. 依據衛生福利部國民健康署「111 年癌症防治品質精進計畫」，有關乳癌及子宮頸癌篩檢之服務量達成率分子計算方式敘述，下列敘述何者不正確？
- (A)45 歲以上未滿 70 歲之身障婦女，乳癌篩檢間隔 2 年 1 次，每完成 1 案/3 分。
  - (B)30 歲以上之婦女，子宮頸癌篩檢間隔 3 年以上未滿 7 年，每完成 1 案/2 分。
  - (C)30 歲以上之身障婦女，子宮頸癌篩檢間隔 3 年以上，每完成 1 案/3 分。
  - (D)40 歲以上未滿 45 歲之高危險群婦女，乳癌篩檢間隔 2 年 1 次，每完成 1 案/2 分。
21. 有關「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」，下列敘述何者不正確？
- (A)提供「居家醫療」、「重度居家醫療」及「安寧療護」三照護階段。
  - (B)照護團隊個案管理人員可由醫師、護理人員、呼吸治療人員或社會工作人員擔任。
  - (C)病人之居家醫療主治醫師可由西醫師或中醫師擔任。
  - (D)居家醫療階段收案條件：失能者巴氏量表(Barthel ADL Index) 大於 60 分。
22. 國民健康署委託國家衛生研究院建立「臺灣慢性病風險評估」模型平台之內容，下列敘述何者不正確？
- (A)計算未來 5 年後罹患 5 種慢性疾病(如:冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件)風險。
  - (B)適用年齡層為 35 至 70 歲。
  - (C)風險結果-以「紅、黃、綠」燈號方式呈現。「紅燈」為「高」風險族群；「黃燈」為「中」風險族群；「綠燈」為「低」風險族群，
  - (D)WHO 心血管風險分法，風險值<10%屬低風險，風險值 10-20%屬中風險，風險值>20%屬高風險。

23. 有關長照機構照護感染疥瘡之服務對象防護原則，下列敘述何者不正確？
- (A) 若為感染結痂型疥瘡（挪威疥）的服務對象，應住單獨房間隔離。
  - (B) 感染者使用過的床墊，依廠商建議使用之清潔液，徹底擦拭塑料床墊表面後，置於單獨空間，至少一週。
  - (C) 若有血體液、嘔吐物、排泄物汙染，範圍大於 10 毫升以上，則需以 0.05%（500ppm）漂白水進行去污，再以清潔劑或肥皂和清水移除污染物質。
  - (D) 治療開始前 3 天內，感染者使用過的布單衣物均須用 60°C 以上的熱水清洗並以高熱乾燥。
24. 永康區某年度粗出生率為 1‰，粗死亡率為 2.5‰，遷入率為 8‰，遷出率為 2‰，針對該社區的敘述下列敘述何者正確？
- (A) 人口自然增加率為 1.5 ‰。
  - (B) 人口社會增加率為 6 ‰。
  - (C) 人口成長值為 9‰。
  - (D) 人口呈現負成長。
25. 依「緊急醫療救護法」第三章規定，有關救護運輸工具的描述，下列敘述何者不正確？
- (A) 救護車分為一般救護車及加護救護車；其裝備標準、用途及有關事項之管理辦法，由中央衛生主管機關定之。
  - (B) 救護車之設置，應向所在地直轄市、縣（市）衛生主管機關申請許可登記，並向所在地公路監理機關申請特屬救護車車輛牌照。
  - (C) 加護救護車出勤之救護人員，至少應有一名為醫師、護理人員或高級以上救護技術員。
  - (D) 救護車執行勤務，應依據所在地直轄市、縣（市）衛生主管機關訂定之收費標準收費。
26. 張奶奶多年前在廁所不慎跌倒造成顱部損傷，經醫院 2 次顱部手術治療，病情好轉後返家休養，因仍依靠鼻胃管灌食，本來由衛生所附設居家護理所提供照護服務，定期更換鼻胃管；但由於張奶奶生病仍需由家人帶到附近診所就醫，極為不便，直到轉由健保「居家醫療照護整合計畫」收案，由醫師及護理人員定期到家中看診並提供置換管路等醫療護理照護，讓張奶奶不必外出奔波就可安心在社區療養。請問張奶奶是符合「全民健康保險居家醫療整合照護計畫」何項收案條件？
- (A) 居家醫療階段。
  - (B) 重度居家醫療階段。
  - (C) 安寧療護階段。
  - (D) 以上皆非。

27. 行政院 110 年 5 月 6 日通過「少子女化對策-建構安心懷孕友善生養環境」，請問下列措施何者不正確？

- ①將現行提供 10 次產前檢查增加至 12 次。
- ②新增妊娠糖尿病篩檢。
- ③1 次一般超音波檢查。
- ④新增貧血檢驗。
- ⑤有薪產檢假增加至 8 日。
- ⑥雙親可同時申請育嬰留職停薪並請領 8 成新最高 6 個月。
- ⑦擴大不孕症試管嬰兒補助對象每胎最多 6 次。

- (A) ①⑥⑦
- (B) ②④⑥
- (C) ①③⑤
- (D) ②⑤⑥

28. 張小姐接受子宮頸抹片檢查，其結果為「意義不明的非典型鱗狀上皮細胞 (Atypical squamous cells, ASC-US)」，在檢查單上的細胞病理診斷標示是 5。社區衛生護理師接獲此一報告結果，進行異常個案追蹤，應建議張小姐做下列何種措施？

- (A) 請張小姐儘快再做 1 次抹片或 HPV (human papilloma virus) 檢測。
- (B) 請張小姐一年後再接受 1 次子宮頸抹片檢查。
- (C) 轉介張小姐至醫療院所接受陰道鏡檢查並做切片以確定診斷。
- (D) 請張小姐至醫療院所接受 HPV 疫苗注射。

29. 有關公共衛生三段五級預防，下列敘述何者正確？

- (A) 實施預防注射是第一段第一級的「促進健康」。
- (B) 定期體檢是第一段第二級的「特殊保護」。
- (C) 實施篩檢是第二段第三級的「早期診斷和適當治療」。
- (D) 公共衛生護理人員鼓勵慢性病患持續服藥，係屬於第三段第五級中的「限制殘障」。

30. 衛生福利部國民健康署參考世界衛生組織(WHO)長者整合性照護指引(Integrated care for older people, ICOPE)，推動長者功能評估工作，ICOPE 含括延緩失能的關鍵六大指標：「認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及憂鬱」，評估時有下列何種情形可於回診時請教醫師？
- ①不知道今天的日期。
  - ②在 12 秒內，雙手抱胸連續起立坐下 5 次。
  - ③過去 2 週覺得心情低落沮喪。
  - ④過去 3 個月體重減少 2 公斤。
  - ⑤與人交談時，常需要對方提高說話音量或再說一次。
- (A)①④⑤  
(B)②③⑤  
(C)①②④  
(D)①③⑤
31. 有關衛生福利部國民健康署所示之糖尿病「自我控制 ABC+DEFG 健康管理」，其中 ABCDEFG 7 個英文字母的排序，下列敘述何者正確？
- (A)糖化血色素、血壓、低密度脂蛋白膽固醇、遵醫囑按時服藥、腎臟功能、眼底檢查、足部檢查。
  - (B)糖化血色素、血壓、低密度脂蛋白膽固醇、遵醫囑按時服藥、眼底檢查、足部檢查、腎臟功能。
  - (C)腎臟功能、遵醫囑按時服藥、糖化血色素、血壓、低密度脂蛋白膽固醇、眼底檢查、足部檢查。
  - (D)糖化血色素、血壓、低密度脂蛋白膽固醇、遵醫囑按時服藥、腎臟功能、足部檢查、眼底檢查。
32. 有關 109 年衛生福利部國民健康署「醫事機構戒菸服務補助計畫」之戒菸藥物治療，下列敘述何者不正確？
- (A)目前臨床上使用戒菸藥物的對象，為年滿 18 歲，其尼古丁成癮度測試(FTND)得分達 4 分或以上，或平均 1 天吸 10 支菸或以上者。
  - (B)目前國內核准用於治療尼古丁依賴的替代藥物非尼古丁藥物：Bupropion SR、Varenicline。
  - (C)目前國內核准用於治療尼古丁依賴的替代藥物尼古丁替代藥物：經皮貼片、口嚼錠、口含錠、口腔吸入劑。
  - (D)可以使用電子菸戒菸。



33. 陳老先生今年 70 歲，育有二子一女，兒女均已成家，住在外地，目前家中只有老夫妻二人，因為經商，兒女都過著富裕的生活，年初陳老先生因意外跌落，頸椎骨折，四肢癱瘓，住院一段時間後醫師宣判無法回復，只好轉回家中照顧，社區衛生護理師接到轉診單，打算到家中訪視，請問欲完成陳家的家庭評估還需要補充那些資料？
- ①家庭的環境特性
  - ②家庭的功能
  - ③家庭的壓力及因應
  - ④家庭的資源
  - ⑤家庭的經濟
  - ⑥家庭成員人數
- (A)①②③④  
(B)①②④⑥  
(C)①③⑤⑥  
(D)③④⑤⑥
34. 有關我國兒童 COVID-19 疫苗接種，下列敘述何者不正確？
- (A)目前我國食品藥物管理署已核准可用於兒童接種者為 Moderna (莫德納) COVID-19 疫苗及 Pfizer-BioNTech COVID-19 兒童劑型疫苗。
- (B)兒童建議接種 2 劑基礎劑，2 劑接種之間隔時間以 4~8 週為原則。
- (C)滿 6 歲至 11 歲兒童接種 Moderna COVID-19 疫苗基礎劑，每劑為 0.25 ml(10 微克)。
- (D)滿 5 歲至 11 歲兒童接種 Pfizer-BioNTech COVID-19 疫苗基礎劑，每劑為 0.2 ml (10 微克)。
35. 有關恙蟲病，下列敘述何者不正確？
- (A)屬於第三類傳染病，應於 72 小時內完成通報。
- (B)是由立克次體引起的急性傳染病，可經由感染立克次體的恙蟎 (Mite) 叮咬傳播。
- (C)發燒 1 週後，軀幹出現暗紅色的丘疹，並擴散至四肢，於數天後消失。
- (D)潛伏期 6~21 天，通常為 9~12 天。
36. 有關庫賈氏病，下列敘述何者不正確？
- (A)庫賈氏病是一種普利昂病 (prion disease)。普利昂病是指具傳染性的異常普利昂蛋白 (prion protein, PrP)，不斷地在神經細胞內複製堆積，最後導致腦部空洞化的一種病變。
- (B)庫賈氏病可分三型：散發型 (sporadic, s-CJD)，佔所有病例數的 80%~90%。
- (C)人是散發型庫賈氏病的為唯一的傳染窩。
- (D)以支持性療法為主，目前並無特殊療法可以延緩本病的進程。

37. 有關猴痘(Monkeypox)，下列敘述何者不正確？
- (A)它是一種 RNA 病毒所導致的疾病。
  - (B)我國將其列為第二類法定傳染病，確診個案必須在 24 小時內通報。
  - (C)它的潛伏期為 5-21 天。
  - (D)可經胎盤垂直傳染給胎兒。
38. 依據「臺南市身心障礙重新鑑定自費檢查補助計畫」，下列敘述何者不正確？
- (A)補助對象：自申請前設籍本市超過 183 日，且依社會救助法第 4 條第 1 項之規定具有低收入戶或中低收入戶證明，因屆期辦理重新鑑定者。
  - (B)核定補助以一年 1 次為限。
  - (C)補助上限為新台幣 2,000 元整，未達補助上限金額，應實支實付，且各項檢查補助金額依全民健康保險支付點數為上限。
  - (D)受理期限至當年度 12 月 31 日止(以郵戳日期為憑)，惟當年度經費如已用罄，即不再受理補助申請。
39. 有關我國「孕婦乙型鏈球菌篩檢補助服務方案」，下列敘述何者不正確？
- (A)自 101 年 4 月 15 日起，全面提供孕婦乙型鏈球菌篩檢補助服務方案。
  - (B)於懷孕婦女妊娠第 35 週至 37 週，提供 1 次乙型鏈球菌篩檢。
  - (C)補助對象限為設籍中華民國國籍孕婦。
  - (D)每案補助新臺幣 500 元。另，低收入戶、中低收入戶、設籍山地原住民族地區、離島偏遠地區之孕婦乙型鏈球菌篩檢服務，不得再收取差額。
40. 有關我國「體外受精(俗稱試管嬰兒)人工生殖技術補助方案」，下列敘述何者不正確？
- (A)補助對象資格至少一方具中華民國國籍之不孕夫妻，且妻年齡為 44 歲(含)以下。
  - (B)受術妻年齡 39 歲以下(含 39 歲)者：每胎(活產)最多補助 6 次。
  - (C)具有中低收入戶或低收入戶之不孕夫妻，每次補助上限新臺幣 15 萬元。
  - (D)受術妻 35 歲(含)以下最多植入 2 個胚胎。
41. 家庭外籍看護工申請招募，雇主應於醫療機構之醫療團隊評估日起多久期間內送件申請招募外籍看護工？
- (A)14 日至 60 日內。
  - (B)30 日至 90 日內。
  - (C)90 日至 120 日內。
  - (D)120 日至 180 日內。

42. 有關 111 年度「臺南市一般護理之家督導考核指標」，下列敘述何者不正確？
- (A) 若聘有外籍看護工，其人數不超過全數照顧服務員 1/2。
  - (B) 最近 2 年內專任工作人員之聘用無違規紀錄。
  - (C) 全日均應有護理人員上班。
  - (D) 護理人員及照顧服務員人力配置分別達設置標準之 1.4 倍(休假係數)以上。
43. 依據「2020」年版美國心臟協會(AHA)心肺復甦術和心血管緊急照護指引(CPR & ECC Guidelines)」對成人 CPR 品質，下列敘述何者不正確？
- (A) 用力(深度至少 5 公分)並快速(速率 100-120 下/分)按壓。
  - (B) 每 3 分鐘更換一次按壓者，疲倦時可提早更換。
  - (C) 盡可能避免中斷壓胸動作。
  - (D) 避免過度通氣。
44. 有關我國之「病人自主權利法」，下列敘述何者不正確？
- (A) 是亞洲第一部以病人為主體之專法。
  - (B) 「預立醫療照護諮商」需至少一位二等親一起參與。
  - (C) 可指定醫療委任代理人。
  - (D) 適用於四種臨床條件。
45. 於醫院發生「滋擾醫療機構秩序或妨礙醫療業務執行」案件時，衛生局應即時了解處置，醫院亦應積極協助醫護人員以及於何處登錄通報？
- (A) 「台灣病人安全通報系統」(TPR 系統)。
  - (B) 台灣醫療品質策進會。
  - (C) 護理職場爭議通報平台。
  - (D) 衛生福利部。
46. 有關衛生福利部公告之「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」，簽約之醫療機構應推派主責醫師，對單一之照護機構，每幾位住民應有 1 名主責醫師，並負責照護機構住民之健康管理、必要診療及轉診。
- (A) 50 名。
  - (B) 60 名。
  - (C) 70 名。
  - (D) 80 名。

47. 依「菸害防制法」的規範，全面禁止吸菸的場所，下列敘述何者不正確？
- (A)五人以上共用之室內工作場所。
  - (B)供室內體育、運動或健身之場所。
  - (C)視聽歌唱業或資訊休閒業之室內場所。
  - (D)政府機關及公營事業機構所在之室內場所。
48. 有關我國「醫療事故預防及爭議處理法」，下列敘述何者不正確？
- (A)111年5月30日立法院三讀通過。
  - (B)以「保障病人權益、促進醫病和諧、提升醫療品質」為目標。
  - (C)秉持「即時關懷」、「調解先行」、「事故預防」等三大原則，全文共計45條。
  - (D)醫療機構應組成醫療事故關懷小組，250床以下醫院及診所，囿於規模可指定專業人員或委由專業團體提供。
49. 依據「護理機構個人資料檔案安全維護計畫實施辦法」規定，事故之預防、通報、應變機制中，發生事故者，應於發現後幾小時內，通報直轄市或縣(市)主管機關及副知中央主管機關？
- (A)24小時。
  - (B)48小時。
  - (C)72小時。
  - (D)96小時。
50. 有關我國「醫療事故預防及爭議處理法」對爭議調解的描述，下列何者不正確？
- (A)衛生福利部應組成醫療爭議調解會。
  - (B)不論民、刑事醫療訴訟均應先經醫療爭議調解會調解。
  - (C)調解期間以3個月為限，必要時可延長3個月。
  - (D)調解成立送法院核定，具司法效果。