

臺南市政府衛生局 105 年度護理人員公開甄試試題

105.06.26

- 本試卷為雙面印刷，共 50 題，皆為單選題，每題 2 分，答錯不倒扣
 - 禁止使用電子計算器
1. () 依人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例，第十七條規定，醫事人員發現感染者之屍體，應於多久內向地方主管機關通報？
 - (A) 一天。
 - (B) 五天。
 - (C) 一週。
 - (D) 一個月。
 2. () 依衛生福利部疾病管制署「傳染病防治工作手冊」，腸病毒感染併發重症的手足口病，是由人類腸病毒 A 型第幾型所引起？
 - (A) 第 61 型。
 - (B) 第 71 型。
 - (C) 第 81 型。
 - (D) 第 91 型。
 3. () 依據衛生福利部疾病管理署對新型 A 型流感的描述，以下何項錯誤？
 - (A) 為第四類法定傳染病。
 - (B) 目前我國採用 10 日作為估計之潛伏期上限。
 - (C) 針對 H5N1 流感已有疫苗可供預防，其他流感亞型之疫苗則尚待研發中。
 - (D) 重症病例的臨床表現多為早期出現發燒、咳嗽及呼吸短促等急性呼吸道感染症狀，而後快速進展為嚴重肺炎，可能併發急性呼吸窘迫症候群、敗血性休克及多重器官衰竭而死亡。
 4. () 依據衛生福利部疾病管理署對中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV) 的描述，以下何項錯誤？
 - (A) 世界衛生組織 (WHO) 於 2012 年 9 月公布全球第一例中東呼吸症候群冠狀病毒感染症病例。
 - (B) 死亡率約達 6 成。
 - (C) 確實傳播途徑仍不明。
 - (D) 感染者通常會有肺炎，部分病人會出現腎衰竭、心包膜炎、血管內瀰漫性凝血 (DIC) 等合併症。

5. () 依據衛生福利部疾病管理署對腸病毒的描述，以下何項錯誤？
- (A) 腸病毒疫情每年約自 3 月下旬開始上升，於 5 月底至 6 月中達到高峰後，即緩慢降低，而後於 9 月份開學後再度出現一波流行。
 - (B) 主要經由腸胃道（糞-口、水或食物污染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，亦可經由接觸病人皮膚水泡的液體而受到感染。
 - (C) 重症病患多為 5 歲以下小孩。
 - (D) 腸病毒屬於小 DNA 病毒科。
6. () 依據衛生福利部疾病管理署對手部衛生的描述以下何項錯誤？
- (A) 世界衛生組織(WHO)自 2009 年開始推動倡導「拯救生命：清潔雙手(Save Lives: Clean Your Hands)」活動。
 - (B) 一般醫療照護單位至少每 2 床之間放置一瓶酒精性乾洗手液。
 - (C) 發展手部衛生五時機。
 - (D) 手部衛生認證採取內部稽核方式。
7. () 社區衛生護理師在社區中欲進行肥胖防治時，第一個步驟應為：
- (A) 評估社區民眾減重的需求。
 - (B) 進行體重控制班課程設計。
 - (C) 與里長討論體重控制班之合適場所。
 - (D) 邀請體重控制相關課程的老師。
8. () 有關臺南市「行動醫院、全民健檢」篩檢項目之目標族群的描述，下列何項錯誤？
- (A) 子宮頸癌目標族群為年滿 30-69 歲，本年度未接受子宮頸抹片篩檢者。
 - (B) 乳癌目標族群為年滿 40-70 歲，2 年內未接受乳房攝影檢查者；年滿 40-44 歲二等親曾有乳癌家族史之婦女，2 年內未接受乳房攝影檢查者。
 - (C) 肝癌目標族群為年滿 40-64 歲，3 年內及年滿 65 歲以上該年度未接受成人健康檢查者。
 - (D) 大腸直腸癌目標族群為年滿 50-75 歲，2 年內未接受大腸直腸癌檢查者。
9. () 依性別工作平等法第 18 條規定，有關受僱者親自哺乳者之相關描述以下何項錯誤？
- (A) 除規定之休息時間外，雇主應每日另給哺乳時間二次。
 - (B) 哺乳時間每次以三十分鐘為度。
 - (C) 哺乳時間，視為工作時間。
 - (D) 子女須未滿二歲。

- 10.() 依家庭暴力防治法第 50 條規定，醫事人員、社會工作人員、臨床心理人員、教育人員、保育人員、警察人員及其他執行家庭暴力防治人員，在執行職務時知有疑似家庭暴力情事者，應立即通報當地主管機關，至遲不得逾幾小時？
- (A) 8 小時。
 - (B) 16 小時。
 - (C) 24 小時。
 - (D) 48 小時。
- 11.() 依據衛生福利部國民健康署對「孕婦乙型鏈球菌篩檢補助服務方案」的描述，以下何項錯誤？
- (A) 篩檢時程是於懷孕婦女妊娠第 35 週至 37 週，提供 1 次乙型鏈球菌篩檢。
 - (B) 補助對象為設籍中華民國國籍孕婦。
 - (C) 補助對象為外國籍或大陸地區人民尚未設籍者，以其中華民國國籍配偶之戶籍地為準。
 - (D) 每案補助新臺幣 800 元。
- 12.() 依衛生福利部疾病管制署對登革熱的描述以下何項錯誤？
- (A) 登革病毒亞屬裡共有四種登革病毒。
 - (B) 104 年 12 月全球首支登革熱疫苗問世，為法國 Sanofi Pasteur 藥廠所生產的 Dengvaxia，屬四價活性減毒疫苗，適用年齡為 9~45 歲的兒童及成人，目前已在台灣核准上市。
 - (C) 全球登革熱發生的地區，主要在熱帶及亞熱帶有埃及斑蚊及白線斑蚊分布的國家
 - (D) 典型登革熱的潛伏期約為 3 至 8 天(最長可達 14 天)。
- 13.() 有關醫院緊急醫療能力分級的描述，以下列何項錯誤？
- (A) 分為三級。
 - (B) 醫學中心必須達重度級。
 - (C) 中、重度級必須具備「急性腦中風病患」、「急性冠心症病患」、「重大外傷」、「高危險妊娠孕產婦及新生兒(含早產兒)」照護的能力。
 - (D) 重度級與中度級的加護病房醫師人力，每 10 床有專責主治醫師 1 人以上。

- 14.() 依據我國菸害防制法第 15 條規定，有關全面禁止吸菸場所的描述以下何項錯誤？
- (A) 醫療機構、護理機構、其他醫事機構及社會福利機構所在場所。但老人福利機構於設有獨立空調及獨立隔間之室內吸菸室，或其室外場所，不在此限。
 - (B) 五人以上共用之室內工作場所。
 - (C) 教室、圖書室、實驗室、表演廳、禮堂、展覽室、會議廳（室）及電梯廂內。
 - (D) 供室內體育、運動或健身之場所。
- 15.() 依性騷擾防治法第 13 條規定，性騷擾事件被害人除可依相關法律請求協助外，並得於事件發生後多久內，向加害人所屬機關、部隊、學校、機構、僱用人或直轄市、縣（市）主管機關提出申訴。
- (A) 半年。
 - (B) 1 年。
 - (C) 2 年。
 - (D) 3 年。
- 16.() 下列何項不是「高齡友善城市指南」之八大面向之一？
- (A) 無礙：馬路綠燈時間夠長。
 - (B) 暢行：提供長輩搭車的優惠、有便利的交通運輸或接送設計。
 - (C) 親老：提倡敬老文化與增進跨代互動，鼓勵業界發展各種銀髮服務和產品。
 - (D) 安居：提供老年公寓供長者居住。
- 17.() 下列關於老化人口與社會的敘述，何項正確？
- (A) 超過總人口的 8%，為高齡化社會（Ageing Society）。
 - (B) 超過總人口的 10%，為轉化高齡社會（Trans-aged Society）。
 - (C) 超過總人口的 14%，為高齡社會（Aged Society）。
 - (D) 超過總人口的 21%，為超高齡社會（super Aged Society）。
- 18.() 臺南市政府衛生局辦理健康老化計畫將預防代謝症候群及慢性病列為重要的宣導事宜，請問以下何項非代謝症候群的指標？
- (A) 高血壓。
 - (B) 高尿酸。
 - (C) 高血糖。
 - (D) 高血脂。

- 19.() 下列關於老人居家生活環境的設計，何項錯誤？
- (A) 浴缸內底部應採凹凸表面或用止滑膠帶。
 - (B) 室內外溫差不宜超過7度，可以避免血管過度收縮或擴張。
 - (C) 浴缸旁及廁所增設扶手。
 - (D) 浴室採用內推式的門。
- 20.() 下列關於團體家屋的敘述，何項正確？
- (A) 專為重度失智症患者所建置的機構。
 - (B) 照顧服務員：患者=1：5。
 - (C) 台灣目前尚無立案團體家屋的開設。
 - (D) 最早為德國所發展。
- 21.() 下列何項不符合全民健保中居家護理收案的條件？
- (A) 病人只能維持有限之自我照顧能力，活動限制在床上或輪椅。
 - (B) 經醫師診斷具有明確之醫療與護理服務項目需求者。
 - (C) 病人病情穩定且身上有鼻胃管或尿管等管路使用者。
 - (D) 需要有人提供個人照顧及家事服務等日常生活的照顧服務者。
- 22.() 下列關於我國全民健保居家護理服務的敘述，何項錯誤？
- (A) 以患者為主要服務核心。
 - (B) 健保署給付每月二次的訪視服務費。
 - (C) 以個案管理的方式提供服務。
 - (D) 使用本項服務者不得再使用長照十年計畫所提供的居家護理服務。
- 23.() 下列關於長期照護的敘述，何項錯誤？
- (A) 長期照護模式可包括機構式、居家式及社區服務等類型。
 - (B) 長期照護服務可包括醫療、技術性護理、個人照護與心理諮商等。
 - (C) 社區式照護涵蓋老人安養機構。
 - (D) 家庭主要照顧者也是長期照護的服務對象。
- 24.() 下列關於我國正在規劃的長照保險「多元評估量表」(MDAI)之敘述，何項錯誤？
- (A) 此評估表為決定未來保險給付等級與水準的標準。
 - (B) 照顧者壓力為評估照顧者負荷之指標。
 - (C) 將針對有就醫的65歲老年人進行行為與精神症狀評估。
 - (D) 居家環境也會納入評估。

- 25.() 以下何項不包括在我國長期照顧十年計畫的補助內容內?
- (A) 輔具購買、租借及住宅無障礙環境改善服務。
 - (B) 老人營養餐飲服務。
 - (C) 交通接送服務。
 - (D) 聘僱外籍看護。
- 26.() 社區衛生護理人員評估社區民眾有營養過剩危險性並發展飲食控制及減重的課程，此為社區健康照護哪一層次?
- (A) 健康促進。
 - (B) 疾病預防。
 - (C) 疾病照護。
 - (D) 限制殘障。
- 27.() 以下何項為增加心肺耐力之健康促進活動? ①800 公尺跑走②100 公尺短跑③仰臥起坐④伏地挺身⑤12 分鐘健走
- (A) ①②。
 - (B) ③④。
 - (C) ①⑤。
 - (D) ③⑤。
- 28.() 根據流行病學調查，下列何項非乳癌的危險因子?
- (A) 生產多胎。
 - (B) 初經早。
 - (C) 高脂肪飲食。
 - (D) 使用女性荷爾蒙。
- 29.() 下列疫苗接種之注意事項，何項錯誤?
- (A) 新生兒體重低於 3000 公克時，不能接種卡介苗疫苗。
 - (B) 新生兒接種白喉、百日咳、破傷風混合疫苗(DPT)會有發高燒的情形。
 - (C) 接種麻疹疫苗(MEASLES)時，偶而會出現柯氏斑點。
 - (D) 水痘疫苗可與麻疹疫苗一起接種，但部位需不同。
- 30.() 下列關於諾羅腸病毒的敘述，何項正確?
- (A) 對成人傳染力不強。
 - (B) 多發生於夏季時節。
 - (C) 主要透過飲食傳播。
 - (D) 不會吸入而感染。

- 31.() 永康區某年度出生率為 1‰，死亡率為 2.5‰，遷入率為 8‰，遷出率為 2‰，針對該社區的敘述下列何項正確？
- (A) 人口自然增加率為 1.5 ‰。
 - (B) 人口社會增加率為 6 ‰。
 - (C) 人口成長值為 9‰。
 - (D) 人口呈現負成長。
- 32.() 公衛護理師發現近年來某個里之意外交通事故發生率偏高，欲深入了解與探討解決之策略，應使用下列何種評估方法較適當？
- (A) 檔風玻璃調查。
 - (B) 田野記錄觀察。
 - (C) 焦點團體訪談。
 - (D) 街頭問卷調查。
- 33.() 依 Green 所提出的 PRECEDE-PROCEED 衛生教育模式，下列指標何項屬於增強因素 (reinforcing factors)：
- (A) 個人知識、態度及價值觀等。
 - (B) 利用資源的便利性。
 - (C) 父母、親友等之健康態度與行為。
 - (D) 醫療設備的完備情形。
34. () 有關茲卡病毒之敘述，下列何項錯誤？
- (A) 自 105 年 2 月 2 日起列為第五類法定傳染病。
 - (B) 自茲卡病毒感染症流行地區離境，應暫緩捐血 28 天。
 - (C) 小頭畸形是依據新生兒的年齡、性別及出生時妊娠期之生長曲線，頭圍小於第 3 個百分位。
 - (D) 臺灣可傳播茲卡病毒的病媒蚊為埃及斑蚊及三斑家蚊。
- 35.() 疥瘡的敘述，下列何項錯誤？
- (A) 疥瘡病原體屬於寄生蟲。
 - (B) 可經由手的接觸或換穿衣服而感染。
 - (C) 病原體在皮下寄生並產卵。
 - (D) 接觸病原體 2 週後，就會出現疥瘡的症狀。

- 36.() 依健康促進之跨越理論模式 (transtheoretical model) 來調查青少年於衛教後執行安全性行為的情形，下列敘述何項正確？
- (A) 想在未來六個月內每次性交都使用保險套的人是屬於準備階段 (preparation)。
 - (B) 想要在一個月內每次性交都使用保險套的人是屬於考慮階段 (contemplation)。
 - (C) 在過去一個月內已經是每次性交都使用保險套是屬於行動階段 (action)。
 - (D) 每次性交都使用保險套且堅持原則是屬於考慮前階段 (precontemplation)。
- 37.() 學校護理師在 AIDS 的健康促進計畫中，在校刊介紹 AIDS，所使用之介入措施是貝克 (Becker) 健康信念模式中那個項目？
- (A) 產生同儕壓力。
 - (B) 建立法規制度。
 - (C) 提供民眾行動的線索。
 - (D) 提高民眾對服務的滿意度。
- 38.() 下列有關月經周期之描述，何項正確？
- (A) 黃體素之分泌主要發生於子宮內膜增生期。
 - (B) 子宮內膜增生期發生於濾泡生長期。
 - (C) 子宮內膜分泌期發生於濾泡生長期。
 - (D) 月經出現於濾泡分化成為黃體之時。
- 39.() 對健康促進與疾病預防的敘述，下列那些正確？①健康促進能使個人功能發揮至最佳狀態；②健康促進非以特殊健康問題為導向；③疾病預防是積極拓展健康的潛能；④疾病預防內容涵蓋健康促進
- (A) ①②。
 - (B) ①③。
 - (C) ②④。
 - (D) ③④。
- 40.() 有關病例對照研究法 (case-control study) 的描述，何項正確？①需要大量的研究對象②容易有個人記憶偏差③長期追蹤費時較長④較難找到適合之對照組。
- (A) ①②。
 - (B) ②③。
 - (C) ②④。
 - (D) ③④。

- 41.() 地段護士進行社區環境訪查，發現 50 戶人家，共有 100 個容器，其中有 3 戶及 20 個容器有被發現登革熱病媒蚊幼蟲孳生，關於上述計算布氏指數為：
- (A) 6%。
 (B) 20%。
 (C) 40。
 (D) 30。

42. () 假設有 920 名動態生活型態者及 880 名靜態生活型態者參與一 5 年的研究計畫，在此期間有 40 名動態生活型態者及 118 名靜態生活型態者被診斷罹患 A 疾病。

	有 A 疾病	無 A 疾病	
動態生活	40	880	920
靜態生活	118	762	880

靜態生活型態者較動態生活型態者罹患 A 疾病的危險對比值 (risk rate ratio) 約是：

- (A) 3.09。
 (B) 2.95。
 (C) 0.43。
 (D) 0.32。
43. () 承上題，這些參與者在此期間 A 疾病發生率為：
- (A) 0.177。
 (B) 0.134。
 (C) 0.088。
 (D) 0.043。
- 44.() 有關「生命之鏈 (chain of survival)」的急救步驟，下列何項正確？① 119②心肺復甦術③自動電擊器④高級心臟救命術。
- (A) ①→②→③→④
 (B) ②→①→③→④
 (C) ①→②→④→③
 (D) ②→①→④→③

45.() 台南市友善社區有 1,000 人口，社區護理師在年初辦理體檢對其進行空腹血糖抽血檢查，發現有 200 人的空腹血糖值超過正常，經過一年，追蹤這 1,000 位受檢者，發現有 250 人的空腹血糖值超過正常，下列敘述何項正確？

- (A) 第一次抽檢空腹血糖過高的盛行率為 20%。
- (B) 第二次抽檢空腹血糖過高的發生率為 25%。
- (C) 空腹血糖過高的總盛行率為 45%。
- (D) 空腹血糖過高的發生率為 50%。

◎情況：針對 172 人進行流感快篩試驗，結果顯示有 22 人為陽性反應，150 人為陰性反應，陽性反應中有 4 人證實罹患流感，陰性反應中有 150 人證實未罹患流感，有關此流感快篩試驗的敘述，下列何項正確？請依此回答以下兩題。

46.() 此流感快篩試驗的敏感性 (sensitivity) 為：

- (A) 2.32%。
- (B) 18.18%。
- (C) 89.28%。
- (D) 100%。

47.() 此流感快篩試驗的陽性預測值 (positive predictive value) 為：

- (A) 2.32%。
- (B) 18.18%。
- (C) 89.28%。
- (D) 100%。

48.() 潘德 (Pender) 的健康促進模式中，哪些因素會影響健康促進行為的參與：①認知因素②環境因素③修正因素④行動線索。

- (A) ①②③。
- (B) ①③④。
- (C) ①②④。
- (D) ②③④。

49.() 莫緊張，35 歲，罹患高血壓且體重過重，他說：「在家人的鼓勵下，這個月我減少了 3 公斤」，根據 Pender 健康促進模式，以上敘述反應何種要素？

- (A) 個人因素：生物的、心理的與社會文化的。
- (B) 人際間的影響：規範、模式。
- (C) 自覺自我效能。
- (D) 個人採取行動的承諾。

50.() 有關中暑的敘述，下列何項正確？

- (A) 因長期處於高溫且潮溼的環境，造成周邊血管擴張。
- (B) 病人皮膚潮紅且乾燥、呼吸快且弱、有譫妄現象。
- (C) 將病人移至陰涼處，採垂頭仰臥姿。
- (D) 用冰袋冰敷四肢來散熱。