

臺南市 106 年護理人員公開甄選試題

106.06.25

●本試卷為雙面印刷，共 50 題，皆為單選題，每題 2 分，答錯不倒扣

●禁止使用電子計算器

()1. 依據衛生福利部疾病管制署對茲卡病毒的描述，以下何者錯誤？

(A)屬於第五類法定傳染病。

(B)茲卡病毒為黃病毒的一種，主要是經由蚊子叮咬傳播。

(C)自茲卡病毒感染症流行地區離境，應暫緩捐血 14 天，避免可能造成輸血感染。

(D)婦女於懷孕期間感染茲卡病毒，可能產下小頭畸形等神經異常新生兒。

()2. 有關 DTaP-Hib-IPV(五合一疫苗)的描述，以下何者錯誤？

(A)接種時程為出生滿 2、4、6、12 個月。

(B)可以同時預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺以及 b 型嗜血桿菌等五種傳染病。

(C)此疫苗將舊型三合一疫苗中的全細胞性百日咳成分，改為非細胞性百日咳，可大幅減少接種後發生注射部位紅腫、疼痛或發燒等不良反應的機率。

(D)採用不活化小兒麻痺疫苗(IPV)取代口服小兒麻痺疫苗(OPV)，以避免發生機率極低的因疫苗引致小兒麻痺症(VAPP)的發生。

()3. 有關衛生福利部疾病管制署擴大 A 型肝炎公費疫苗接種試辦計畫的描述，以下何者錯誤？

(A)實施期間為 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

(B)實施對象為自實施日起，凡確診為愛滋病毒(HIV)感染者或新確診為梅毒、淋病者，且為 1977 年 1 月 1 日(含)以後出生之性傳染病患者。

(C)公費提供施打 2 劑 A 型肝炎疫苗。

(D)如有免疫功能不足者，可經醫師評估接種 3 劑。

- ()4. 有關各項常規疫苗第一劑最小接種年齡的描述，以下何者錯誤？
- (A) B 型肝炎疫苗(HepB)為出生 24 小時內儘速接種。
 - (B) 日本腦炎疫苗(JE)為出生後 12 個月接種。
 - (C) 水痘疫苗(Varicella)為出生後 12 個月接種。
 - (D) A 型肝炎疫苗(HepA)為出生後 6 個月接種。
- ()5. 依衛生福利部疾病管制署對登革熱的描述，以下何者錯誤？
- (A) 登革病毒亞屬裡共有四種登革病毒。
 - (B) 104 年 12 月全球首支登革熱疫苗問世，為法國 Sanofi Pasteur 藥廠所生產的 Dengvaxia，屬四價活性減毒疫苗，適用年齡為 9~45 歲的兒童及成人，目前已在台灣核准上市。
 - (C) 全球登革熱發生的地區，主要在熱帶及亞熱帶有埃及斑蚊及白線斑蚊分布的國家。
 - (D) 典型登革熱的潛伏期約為 3 至 8 天(最長可達 14 天)。
- ()6. 臺南市政府衛生局於各區衛生所辦理「行動醫院、全民健檢」第一階段時提供什麼量表讓社區民眾及其家屬填寫，以利其自我評估是否為失智症危險族群？
- (A) SPMSQ 失智症篩檢量表。
 - (B) AD-8 極早期失智症篩檢量表。
 - (C) MMSE 簡短智能測驗。
 - (D) CDR 臨床失智評分量表。
- ()7. 請問臺南市「行動醫院、全民健檢」篩檢項目之肝癌篩檢的目標族群為以下何者？
- (A) 年滿 40-64 歲 3 年內及年滿 65 歲以上該年度未接受成人健康檢查者。
 - (B) 年滿 45-64 歲 3 年內及年滿 65 歲以上該年度未接受成人健康檢查者。
 - (C) 年滿 50-64 歲 3 年內及年滿 65 歲以上該年度未接受成人健康檢查者。
 - (D) 年滿 55-64 歲 3 年內及年滿 65 歲以上該年度未接受成人健康檢查者。

- ()8. 有關台南市政府衛生局所推展的自殺防治的描述，以下何者錯誤？
- (A) 宣導設計以「珍愛生命守門人，一問二應三轉介」為主軸。
 - (B) 心情的量測採用貝氏(Beck)憂鬱量表。
 - (C) 轉介標準包含潛在精神疾病。
 - (D) 問的重點包含自殺意念與精神症狀的評估。
- ()9. 臺南市政府衛生局 2017 年辦理「老年人功能性體適能檢測」，請問檢測內容不包含以下哪一項？
- (A) 30 秒坐到站。
 - (B) 30 秒手臂屈舉。
 - (C) 抓背測驗。
 - (D) 3 分鐘踏步。
- ()10. 有關臺南市民免費裝置全口活動假牙計畫的描述，以下何者錯誤？
- (A) 實施對象為設籍於臺南市 65 歲以上老人暨 55 歲以上原住民，並經本市合約牙科醫療院所牙科醫師評估需裝假牙者。
 - (B) 每人每顎僅補助一次。
 - (C) 已申請過「內政部中低收入戶老人補助假牙實施計畫」者，3 年內不予重複補助。
 - (D) 裝置額度為每人每顎上限新台幣 2 萬元，全口雙顎上限為新台幣 4 萬元，如有特殊個案則專案處理。
- ()11. 依據職業安全衛生法第 31 條規定，中央主管機關指定之事業，雇主應對有母性健康危害之虞之工作，採取危害評估、控制及分級管理措施；對於妊娠中或分娩後未滿幾年之女性勞工，應依醫師適性評估建議，採取工作調整或更換等健康保護措施，並留存紀錄。
- (A) 半年。
 - (B) 1 年。
 - (C) 2 年。
 - (D) 3 年。

- ()12. 有關衛生福利部國民健康署特殊群體生育調節補助作業說明之子宮內避孕器裝置及結紮手術減免對象，不包含以下何者？
- (A)本人或其配偶、子女患有精神疾病。
 - (B)本人或其配偶、子女患有有礙優生疾病。
 - (C)本人或其配偶、子女領有身心障礙手冊。
 - (D)本人或其配偶、子女列案為中低收入戶。
- ()13. 有關「學齡前兒童視力、立體感篩檢」作業流程與注意須知的描述，以下何者錯誤？
- (A)只要經過「學齡前兒童視力、立體感篩檢」相關操作技術訓練的幼、托園所老師，(或由受過訓練衛生所護理人員執行)，即可進行篩檢工作。
 - (B)篩檢工具為視力表、立體感篩檢工具。
 - (C)篩檢環境建議照度為 300~400 米燭光。
 - (D)篩檢工具若為 C 字視力表，則受檢距離為 5 公尺。
- ()14. 「2015 年版美國心臟協會(AHA)心肺復甦術和心血管緊急照護指引(CPR & ECC Guidelines)」，建議對於到院前心臟停止(OHCA)患者生存之鍊的順序，以下何者正確？
- (A)確認並啟動緊急應變系統、立即進行高品質 CPR、進行快速去顫、基礎及高級緊急醫療服務、高級救命術與心臟停止後照護。
 - (B)確認並啟動緊急應變系統、進行快速去顫、立即進行高品質 CPR、基礎及高級緊急醫療服務、高級救命術與心臟停止後照護。
 - (C)確認並啟動緊急應變系統、立即進行高品質 CPR、進行快速去顫、高級救命術與心臟停止後照護、基礎及高級緊急醫療服務。
 - (D)立即進行高品質 CPR、進行快速去顫、確認並啟動緊急應變系統、基礎及高級緊急醫療服務、高級救命術與心臟停止後照護。

- ()15. 「2015 年版美國心臟協會(AHA)心肺復甦術和心血管緊急照護指引(CPR & ECC Guidelines)」，建議對於心臟停止的成人患者，進行胸部按壓的速率應為每分鐘幾次？
- (A)60-80 次。
 - (B)80-100 次。
 - (C)100-120 次
 - (D)120-140 次。
- ()16. 依公共場所必要緊急救護設備管理辦法第八條規定，使用 AED 急救結束，設置 AED 場所應填寫 AED 使用紀錄表。前項紀錄表及 AED 使用之電子資料，應於急救事件結束幾日內，郵寄中央衛生福利主管機關備查。
- (A)4 天。
 - (B)5 天。
 - (C)6 天。
 - (D)7 天。
- ()17. 依公共場所必要緊急救護設備管理辦法第七條規定，設置 AED 場所應定期檢查 AED 電池、耗材有效日期及其功能，維持機器正常運作，並製作檢查紀錄，妥善保存備查；其保存期間，至少幾年？
- (A)半年。
 - (B)1 年。
 - (C)2 年。
 - (D)3 年。
- ()18. 衛生福利部疾病管制署因應近期國內流感疫情呈上升趨勢，自 105 年 12 月起至 106 年 7 月底擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，以下何者錯誤？
- (A)孕婦經評估需及時用藥者。
 - (B)罹患糖尿病等之類流感患者。
 - (C)肥胖(BMI \geq 27)之類流感患者。
 - (D)家人/同事/同班同學有類流感發病者。

- ()19. 如果有求診者發燒，體溫達攝氏 37.5 度的話，醫護人員一定會即時向他們提出 TOCC 四個問題，以下何者錯誤？
- (A) 旅遊史(T)。
 - (B) 職業別(O)。
 - (C) 家族史(C)。
 - (D) 是否群聚(C)。
- ()20. 下列關於代謝症候群的診斷依據，以下何者錯誤？
- (A) 男性腰圍 ≥ 90 公分，女性 ≥ 80 公分。
 - (B) 三酸甘油脂 $\geq 150\text{mg/dL}$ 。
 - (C) 血壓 $\geq 130/85\text{mmHg}$ 。
 - (D) 高密度脂蛋白膽固醇，男性 $\geq 40\text{mg/dL}$ ，女性 $\geq 50\text{mg/dL}$ 。
- ()21. 關於日本腦炎之敘述，以下何者錯誤？
- (A) 感染日本腦炎的患者嚴重者，可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，甚至死亡。
 - (B) 台灣每年 5 至 10 月為流行期。
 - (C) 以埃及斑蚊為主要病媒蚊，叮咬人的高峰期在黎明和黃昏時段。
 - (D) 目前幼兒常規接種提供新型活性減毒日本腦炎疫苗，只需接種 2 劑。
- ()22. 有關「潛伏期的結核感染者」(LTBI) 之描述，以下何者正確？
- (A) 丙型干擾素釋放試驗(IGRA)為陽性。
 - (B) 痰塗片及痰液培養皆為陽性。
 - (C) 痰塗片陽性、X 光片異常。
 - (D) 痰塗片陽性及痰液培養陰性。
- ()23. HIV (Human Immunodeficiency Virus) 即是人類免疫缺乏病毒，俗稱愛滋病毒，以下何者錯誤？
- (A) 傳染途徑：性行為傳染、血液傳染、母子垂直感染。
 - (B) 目前的藥物治療可以改善存活率，但仍沒有把握治癒愛滋病毒感染。
 - (C) 嬰兒不會由其已感染病毒的母親因授乳而得到愛滋病毒。
 - (D) HIV-1 是大多數國家中最主要造成愛滋病的病因。

- ()24. 20 歲的餐廳女服務生依玲，身高 160 公分、體重 66 公斤，請問以下何者落在標準體重範圍內(四捨五入)？
- (A)44~52 公斤。
 - (B)51~61 公斤。
 - (C)52~66 公斤。
 - (D)60~68 公斤。
- ()25. 關於腸病毒的敘述，以下何者錯誤？
- (A)腸病毒感染併發重症屬於第三類傳染病。
 - (B)醫師或醫療（事）機構於診治或發現符合之病人時，應於一週內向當地衛生局報告。
 - (C)腸病毒可以引發多種疾病，其中很多是沒有症狀的感染，或只出現類似一般感冒的輕微症狀。
 - (D)腸病毒 A22 型的致病力較高。
- ()26. 有關戒菸之描述，以下何者錯誤？
- (A)不建議孕婦使用戒菸藥物。
 - (B)一般戒斷症狀約在 24 小時內達到最高峰。
 - (C)一般戒菸後體重約增加 2 至 3 公斤，這是尼古丁戒斷症狀。
 - (D)以電子煙來戒菸副作用小，可多採用。
- ()27. 腸病毒的消毒方法，以下何者錯誤？
- (A)食物經過加熱處理，或將內衣褲浸泡熱水，都可減少腸病毒傳播。
 - (B)一般環境消毒，建議使用 1,000ppm 濃度之漂白水。
 - (C)不需要大規模噴藥消毒，只需對於常接觸物體表面、玩具、遊樂設施、寢具及書本做重點性消毒。
 - (D)腸病毒對酸及許多化學藥物具抵抗性，如抗微生物製劑、清潔消毒劑及酒精，均無法殺死腸病毒。
- ()28. 健康成年人改善心肺耐力及身體組成的運動建議，以下何者錯誤？
- (A)每週至少規律運動三次。
 - (B)每次至少二十分鐘。
 - (C)預估最大心跳率=220-年齡。
 - (D)運動時心跳率應達最大心跳率 50 %以上。

- ()29. 健康體能的四大要素，以下何者錯誤？
- (A)心肺耐力。
 - (B)肌力與肌耐力。
 - (C)柔軟度。
 - (D)身體肌肉百分比。
- ()30. 關於肺結核的說明，以下何者錯誤？
- (A)經由驗痰發現結核桿菌，是肺結核最重要的診斷依據。
 - (B)咳嗽超過四週，宜儘速就醫。
 - (C)目前我國卡介苗接種的政策是：建議接種時間為出生滿 5-8 個月。
 - (D)若給予適當的抗結核藥物治療，結核病幾乎可以百分之百痊癒。
- ()31. 關於菸害防制的敘述，以下何者錯誤？
- (A)菸品得以郵購、電子購物方式販賣之。
 - (B)經濟困難者之保險費補助為菸品健康福利捐應用之一部分。
 - (C)不得以公益活動方式為菸品宣傳。
 - (D)未滿十八歲者，不得吸菸；孕婦亦不得吸菸。
- ()32. 腰臀圍比測量法，以下何者錯誤？
- (A)腰臀圍比 = 腰圍(公分) ÷ 臀圍(公分)。
 - (B)以皮尺測量腰圍時以腸骨上嵴及肋骨下緣連線中點為準。
 - (C)測量腰圍時應保持吐氣之狀態。
 - (D)腰臀圍比：男性小於 0.92，女性小於 0.88 為理想數值。
- ()33. 跟想自殺的個案互動，以下何者錯誤？
- (A)可探問他有關自殺的想法、企圖、計畫等問題。
 - (B)接觸當事人前，要先排除自己的主觀價值判斷及道德感。
 - (C)要設法說服當事人自殺是錯誤的行為。
 - (D)選擇安靜及有隱私的環境來討論問題。

- ()34. 戒菸班的活動內容包括寫戒菸日誌、學拒菸技巧、瞭解吸菸的危害、進行戒菸宣言等，合乎 1986 年渥太華憲章 (Ottawa Charter) 中何項健康促進行動？
- (A)健康的公共政策。
 - (B)創造支持性環境。
 - (C)發展個人技巧。
 - (D)調整健康服務方向。
- ()35. 社區護理師建議滿 57 歲有咀嚼檳榔習慣的方小姐，去年有完成子宮頸抹片檢查及口腔黏膜篩檢，請問今年可做哪些免費癌症篩檢項目？①糞便潛血檢查②乳房 X 光攝影③口腔黏膜篩檢④子宮頸抹片檢查
- (A)①②。
 - (B)③④。
 - (C)①②④。
 - (D)①②③。
- ()36. 有關糖尿病前期(prediabetes)的描述，以下何者錯誤？
- (A)空腹 8 小時以上的血漿糖值於 100-125mg/dl 稱之。
 - (B)空腹 8 小時以上的血漿糖值高於 126 mg/dl 稱之。
 - (C)少活動是危險因子。
 - (D)減重可改善胰島素抗阻性、避免糖尿病前期惡化成第 2 型糖尿病。
- ()37. 幸福社區某年的年中人口資料，0-14 歲有 90 人，15-64 歲有 200 人，65 歲以上有 100 人，該社區之老化指數是？
- (A)45%。
 - (B)50%。
 - (C)90%。
 - (D)111.1%。

- ()38. 根據臨床觀察，罹患冠狀動脈心臟病的病例中，有 25-40%的病例在症狀出現後 24 小時內死亡。此一「25-40%」的數值是：
- (A)死亡率(mortality rate)。
 - (B)致死率(fatality rate)。
 - (C)死亡的相對危險性(relative risk)。
 - (D)死亡的可歸因危險性(attributable risk)。
- ()39. 下列何種研究設計最能證實 B 型肝炎帶原狀態與肝癌間的因果關係？
- (A)生態研究。
 - (B)病例對照研究。
 - (C)世代研究。
 - (D)橫斷面研究。
- ()40. 針對敏感性族群，下列那個細懸浮微粒(PM2.5)濃度，需建議減少戶外活動？
- (A)10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)。
 - (B)20($\mu\text{g}/\text{m}^3$)。
 - (C)30($\mu\text{g}/\text{m}^3$)。
 - (D)40($\mu\text{g}/\text{m}^3$)。
- ()41. 有關血清腫瘤標記，CEA (carcinoembryonic antigen) 之描述，以下何者正確？
- (A)可供簡易追蹤大腸癌術後是否復發。
 - (B)是早期偵測肝細胞癌的特異性指標。
 - (C)是理想篩檢早期大腸癌的檢驗。
 - (D)敏感性特異性好，達 90%。
- ()42. 公衛護士做家庭評估中的「住屋」評估，最終的目的為何？
- (A)了解家庭的內在結構。
 - (B)了解家人間互動關係。
 - (C)了解住屋條件對家庭健康的影響。
 - (D)改善家庭的經濟狀況。

- ()43. 於短時間內瞭解家庭功能狀況，Smilkstein (1978) 提出可採用 APGAR，以下何者正確？①A(Active)，指積極度②總分 0 分，表示重度功能障礙 ③G(Giving)，指情感給予的程度④R(Resolve)，指融洽度。
- (A)① ③。
(B)① ④。
(C)② ③。
(D)② ④。
- ()44. 護理師帶領社區婦女組成健走俱樂部，每週同一時間相約健走，並且帶動其家人共同參與，這項活動措施種類是屬於何者行為改變？
- (A)媒體行銷。
(B)團體支持。
(C)公共政策。
(D)環境改造。
- ()45. 在推動社區健康營造時，社區衛生護理師的功能，以下何者錯誤？
- (A)提供完整性社區評估。
(B)提供醫療相關服務。
(C)提供符合社區的衛教服務。
(D)決定社區健康營造議題。
- ()46. 下列何者不是健康城市主要的精神？
- (A)著重城市中硬體環境之增設。
(B)持續創造及改善自然、社會環境，社區資源相互支援，以發揮人類的最大潛能。
(C)經營城市的文化產業，結合商業運作以奠定城市之經濟基礎，做為營造健康的本錢。
(D)由下而上，結合城市中基層民眾的聲音與力量，爭取足夠的健康醫療環境與預算。

- ()47. 王小姐產後餵母乳，坐完月子後回職場工作準備以集乳方式儲存母乳，下班後帶回家哺餵寶寶；依據「性別工作平等法」，保障王小姐哺育母乳權益的項目中，下列內容何者違反規定？
- (A) 寶寶未滿1歲前，王小姐除規定之休息時間外，其雇主應每日另給集乳時間2次，每次以30分鐘為限。
- (B) 王小姐上班時的集乳時間，視為工作時間，老闆不可扣薪或扣時。
- (C) 王小姐係以集乳方式非親自哺乳，故不包含「性別工作平等法」保障範圍。
- (D) 王小姐的先生(寶寶的父親)也可向其雇主申請哺乳時間。
- ()48. 林奶奶有心律不整，每天需服用毛地黃，以下何者正確？
- (A) 其強心作用是透過鈉鉀幫浦(pump)的興奮作用。
- (B) 可以抑制房室節的傳導，中毒時不會造成心室纖維顫動。
- (C) 若有服用利尿劑，可能會造成鈉離子的流失。
- (D) 早期中毒會出現噁心、嘔吐等腸胃症狀。
- ()49. 下列何種食物可能會增加罹患大腸癌的危險？
- (A) 高脂飲食。
- (B) 高鉀飲食。
- (C) 高糖飲食。
- (D) 高蛋白飲食。
- ()50. 下列何種現象可以用來鑑別是否為職業性肩頸痛？
- (A) 家人亦有此症狀。
- (B) 接受治療即可改善。
- (C) 離開工作場所數天後，症狀即有改善。
- (D) 無法根治。