

臺南市 107 年護理人員公開甄選試題

107.06.24

- 本試卷為雙面印刷，共 50 題，皆為單選題，每題 2 分，答錯不倒扣
- 禁止使用電子計算器

- () 1. 患有心臟、呼吸道及心血管疾病之患者及孩童、老年人等敏感族群，在空氣品質指標(Air Quality Index, AQI)何種狀況下，即應減少戶外活動？
- (A)黃色 (AQI: 51-100)
 - (B)橘色 (AQI: 101-150)
 - (C)紅色 (AQI: 151-200)
 - (D)紫色 (AQI: 201-300)
- () 2. 五歲琪琪因高燒就醫，護理師發現她從出生至今許多疫苗接種均未完成，身材較同年齡兒童瘦小且衣著髒亂，宜考慮琪琪可能遭受哪一類的兒童虐待事件？
- (A)身體虐待。
 - (B)精神虐待。
 - (C)疏忽。
 - (D)性虐待。
- () 3. 下列那些非兒童虐待「責任通報」人員？
- (A)教育人員。
 - (B)戶政人員。
 - (C)里長。
 - (D)鄰居、親友。
- () 4. 有關長期照顧十年計畫 2.0 (長照 2.0)之描述何者錯誤？
- (A)社區整體照顧 ABC 模式為其核心服務，A 代表社區整合型服務中心，B 是複合型服務中心，C 則是巷弄長照站。
 - (B)設置長照專線 1966 以提供便利可及的長照服務窗口。
 - (C)服務對象除 65 歲以上老人外，更擴及 50 歲以上失智症者、55 歲以上原住民及任何年齡的失能身心障礙者。
 - (D)僅以巴氏量表來評定服務對象之長照失能程度。

- ()5. 下列有關人類免疫缺乏病毒(HIV)感染之描述何者錯誤?
- (A)確定病例之通報條件為抗體篩檢或抗原/抗體複合型檢測陽性，再經西方墨點法檢驗為陽性者。
 - (B)媽媽為 HIV 感染者，則其寶寶符合極可能病例之通報條件者。
 - (C)一般來說，人類免疫缺乏病毒在疾病空窗期時病毒量最低、感染力最弱。
 - (D)感染病毒之母親不建議母乳哺餵，以免嬰兒受到病毒的感染。
- ()6. 下列茲卡病毒感染症之描述何者錯誤?
- (A)茲卡病毒感染之症狀與登革熱相似但較為輕微。
 - (B)從流行地區返台者應落實「1+6 原則」，採取安全性行為、延後懷孕至少 1 個月，暫緩捐血至少 6 個月。
 - (C)孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡。
 - (D)典型症狀為關節痛、紅疹、結膜炎、頭痛、肌肉痠痛及後眼窩痛等。
- ()7. 下列有關鴉片類物質成癮替代治療之描述，何者錯誤?
- (A)口服美沙冬藥物或丁基原啡因舌下錠對病人的副作用較小，突然停用時不會產生戒斷症候群。
 - (B)美沙冬可「替代」海洛因之毒癮，其藥效時間比海洛因長，故一天只需服用一次。
 - (C)丁基原啡因舌下錠屬三級管制藥品，最多可攜帶 2 週處方藥量回家服用。
 - (D)目前美沙冬替代治療不屬於健保給付範圍，需自費參加。
- ()8. 八歲(含)以下兒童初次接種流感疫苗需接種兩劑，請問此兩劑需相隔多久接種?
- (A)兩劑可同時接種不需間隔。
 - (B)4 週。
 - (C)8 週。
 - (D)12 週。
- ()9. 有關性別平等法中哺(集)乳時間之規定何者正確?
- (A)除規定之休息時間外，雇主應每日另給哺(集)乳時間六十分鐘。
 - (B)除規定之休息時間外，雇主應每日另給哺(集)乳時間三十分鐘。
 - (C)在每日正常工時之外，延長工時超過 1 小時者，雇主另外給予哺(集)乳 15 分鐘。
 - (D)唯有女性受僱者可請哺(集)乳時間。

- ()10. 某區域人口約為2500人，該地區目前罹患A型肝炎之人口約為20名，每年約增加2名新感染個案，則該地區A型肝炎的盛行率與發生率各為？
- (A)盛行率為 0.08 %，發生率為 0.8%。
(B)盛行率為 0.8 %，發生率為 0.08%。
(C)盛行率為 8 %，發生率為 0.8%。
(D)盛行率為 1.6%，發生率為 0.16%。
- ()11. 下列有關自動體外心臟電擊去顫器(AED)之設置及管理之描述，何者正
確？
- (A)高鐵、機場及客房房間超過 100 間之旅館都應設置。
(B)可以「高密度、高風險、高效益、難到達」之原則來選擇設置地點。
(C)初級救護技術員資格以上人員才能使用。
(D)負責管理 AED 之管理員應接受並完成心肺復甦術及 AED 相關訓練，並每年接受複訓。
- ()12. 下列有關登革熱之描述何者錯
誤？
- (A)登革熱依抗原性可分為四種型別。
(B)噴藥消滅成蚊對防止登革熱效果有限，最重要的是要防堵孳子的產生。
(C)典型臨床症狀為發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等。
(D)發病 3 日內，應注意避免被蚊子叮咬。
- ()13. 下列有關糖尿病併發症之預防「自我控制ABCDEFGH健康管理」的描述何者錯
誤？
- (A)糖化血色素(HbA1c)低於 7%以下，每 3 個月檢查 1 次。
(B)血壓(Blood Pressure)控制在 130/80mmHg 以下。
(C)低密度脂蛋白膽固醇(LDL-Cholesterol)低於 50mg/dL，每年至少檢查 1 次。
(D)眼(Eye)底檢查、足(Foot)部檢查及尿液白蛋白都應每年至少檢查 1 次。
- ()14. 下列疫苗何者孕婦不
能接種？
- (A)流感疫苗。
(B)百日咳疫苗。
(C)麻疹疫苗。
(D)B 型肝炎疫苗。

- ()15. 下列何者是失智症患者安全居家環境?
- (A)為避免影響患者睡眠，房間內最好不要安置小夜燈。
 - (B)應避免放置個人及親友的照片，以免患者觸景傷感。
 - (C)家中的光線越強越亮越好，可避免患者跌倒。
 - (D)廁所門把顏色對比明顯、易見，方便個案辨識。
- ()16. 有關「血壓3C管理」之描述何者錯誤?
- (A)Check 規律測量：18 歲以上民眾每年至少量 1 次，有家族史更應定期測量。
 - (B)Confirm：130/60 mmHg 是最佳防線，超過 150/90 mmHg 即應就醫。
 - (C)Change 改變習慣：飲食應掌握三少二多原則，並建立良好生活習慣。
 - (D)Control 控制血壓：居家自我血壓監控，並遵循醫師建議以達高血壓治療目標。
- ()17. 有關「分級醫療，雙向轉診」之六大策略描述下列何者錯誤?
- (A)調整醫學急診部分負擔，例如不論檢傷分類幾級，全面調高急診部分負擔。
 - (B)提昇基層醫療服務量能，例如擴大診所服務範疇，讓民眾不因某些檢查、檢驗只能在醫院執行，而需至醫院就醫。
 - (C)導引民眾轉診就醫習慣，如調整門診部分負擔，鼓勵民眾先至診所就醫，後經轉診至醫學中心或區域醫院就醫者，則調降其門診部分負擔。
 - (D)加強醫療財團法人管理，例如規範醫院不得以交通車載送方式招攬輕症病人。
- ()18. 下列何者非長者衰弱評估量表(SOF)之指標?
- (A)體重減輕。
 - (B)跌倒史。
 - (C)下肢功能。
 - (D)精力降低。
- ()19. 衛生局受理自殺風險個案通報後，應當如何處置?
- (A)如個案有危及生命之緊急情況，應立即通報警察機關 110 或消防機關 119 派員前往現場處理。
 - (B)所有個案都應強制住院治療。
 - (C)若為再自殺個案，則接獲通報後，3 個工作日內應初次關懷。
 - (D)自殺風險個案關懷訪視，原則上服務為期 6 個月，每個月訪視 1 次。

- ()20. 依據衛生福利部疾病管制署對狂犬病的描述，以下何者**錯誤**？
- (A)屬於第一類法定傳染病。
 - (B)是由狂犬病病毒引起的一種急性病毒性腦脊髓炎，一旦發病後，致死率相當高。
 - (C)依接觸類型將暴露傷口等級分為四類。
 - (D)依 WHO 建議將暴露後治療分為三類。
- ()21. 依據臺南市麻疹疑似個案基層診所作業流程，請問符合麻疹通報定義者，以下何者**錯誤**？
- (A)出疹。
 - (B)發燒(耳溫或肛溫)大於攝氏 39 度。
 - (C)無麻疹疫苗相關接種史。
 - (D)發病前三周內，曾有麻疹流行地區旅遊史。
- ()22. 有關臺南市107年度流感疫苗接種計畫目標對象的描述，以下何者**錯誤**？
- (A)50 歲以上成人、機構對象、罕病及重大傷病者。
 - (B)高風險慢性病患及高 BMI(≥ 30)。
 - (C)1 歲內嬰兒之父母。
 - (D)孕婦。
- ()23. 有關結核病個案管理的描述，以下何者**錯誤**？
- (A)由個案居住地衛生所於通報後 7 個工作天內完成收案作業
 - (B)首次訪視個案應了解其結核病診療情形，並進一步評估其身體、心理及社會之整體狀態，以掌握個別需求及規劃後續照護重點。
 - (C)以家訪為佳或視個案需求/服藥順從性等，運用不同訪視方式，可達到客觀評估個案治療、服藥及副作用等狀態為原則。
 - (D)依個案需求規劃訪視頻率，但至少應每月訪視二次。
- ()24. 依衛生福利部疾病管制署對登革熱病例群聚定義的描述，以下何者**正確**？
- (A)同村里內 1 例確定病例。
 - (B)其居住地/活動地點彼此不超過 150 公尺。
 - (C)登革熱病例發病日間隔小於或等於 21 天。
 - (D)以上皆正確。

- ()25. 臺南市政府衛生局 107 年度施政目標以「行動醫院、全民健檢」為平台辦理癌症及慢性病篩檢，預計服務多少人次？
- (A)2 萬人次。
(B)2.5 萬人次。
(C)3 萬人次。
(D)3.5 萬人次。
- ()26. 請問臺南市「行動醫院、全民健檢」篩檢項目之大腸直腸癌篩檢的目標族群為以下何者？
- (A)年滿 40-64 歲 2 年內未接受大腸直腸癌篩檢者。
(B)年滿 45-64 歲 2 年內未接受大腸直腸癌篩檢者。
(C)年滿 50-75 歲 2 年內未接受大腸直腸癌篩檢者。
(D)年滿 55-75 歲 2 年內未接受大腸直腸癌篩檢者。
- ()27. 有關「醫事服務機構辦理口腔預防保健服務注意事項」兒童牙齒塗氟保健服務的描述，以下何者**錯誤**？
- (A)為維護醫療品質，建議牙醫師至幼兒園/學校塗氟，每診次每位醫師最高人次以 40 人為限。
(B)未滿六歲，每半年補助一次。
(C)未滿十二歲之低收入戶、身心障礙、設籍原住民族地區、偏遠及離島地區兒童，每三個月補助一次。
(D)兒童牙齒塗氟保健服務，氟濃度至少應為 8500ppm 以上。
- ()28. 有關「優生保健措施減免或補助費用辦法」所減免或補助費用的優生保健措施，**不包含**以下哪一項？
- (A)中央主管機關認定之新生兒先天性代謝異常疾病篩檢。
(B)本人或其四親等以內血親疑似罹患遺傳性疾病，需進一步檢查者。
(C)本人或其配偶、子女有精神疾病之結紮手術。
(D)三十歲以上孕婦細胞遺傳學檢查。
- ()29. 臺南市政府衛生局中程施政計畫，在愛滋病方面的目標為期望能達成 2020 年多少比率感染者知道自己病況？多少比率知道病況者服用藥物？多少比率服用藥物者病毒量成功抑制？
- (A)「80-70-60」。
(B)「70-80-90」。
(C)「60-70-80」。
(D)「90-90-90」。

- ()30. 「2017年版美國心臟協會(AHA)心肺復甦術和心血管緊急照護指引(CPR & ECC Guidelines)」，在放置高級呼吸道裝置(聲門上部呼吸道或氣管內管)之前，可由緊急醫療服務實施人員進行按壓與吹氣循環的CPR，其建議按壓胸口與吹氣的比例為以下何者?
- (A)按壓胸口 15 次，再吹氣 1 次。
 - (B)按壓胸口 15 次，再吹氣 2 次。
 - (C)按壓胸口 30 次，再吹氣 1 次。
 - (D)按壓胸口 30 次，再吹氣 2 次。
- ()31. 請問衛生福利部公共場所民眾 CPR+AED 教材，完整版急救流程教導民眾的急救口訣為以下哪一個?
- (A)叫、叫、壓、吹、電。
 - (B)叫、叫、吹、壓、電。
 - (C)叫、叫、電、吹、壓。
 - (D)叫、叫、吹、電、壓。
- ()32. 依公共場所哺(集)乳室設置及管理標準規定哺(集)乳室應具的基本設備，不包括以下何者?
- (A)靠背椅。
 - (B)集乳器。
 - (C)電源設備。
 - (D)緊急求救鈴或其他求救設施。
- ()33. 依緊急醫療救護法第三章規定，有關救護運輸工具的描述，以下何者錯誤?
- (A)救護車分為一般救護車及加護救護車；其裝備標準、用途及有關事項之管理辦法，由中央衛生主管機關定之。
 - (B)救護車之設置，應向所在地直轄市、縣(市)衛生主管機關申請許可登記，並向所在地公路監理機關申請特屬救護車車輛牌照。
 - (C)加護救護車出勤之救護人員，至少應有一名為醫師、護理人員或高級以上救護技術員。
 - (D)救護車執行勤務，應依據所在地直轄市、縣(市)衛生主管機關訂定之收費標準收費。

- ()34. 依據菸害防制法第 15 條規定，全面禁止吸菸的場所，下列何者錯誤？
- (A)醫療機構、護理機構、其他醫事機構及社會福利機構所在場所。但老人福利機構於設有獨立空調及獨立隔間之室內吸菸室，或其室外場所，不在此限。
 - (B)歌劇院、電影院、視聽歌唱業或資訊休閒業及其他供公眾休閒娛樂之室內場所。
 - (C)金融機構、郵局及電信事業之營業場所。
 - (D)四人以上共用之室內工作場所。
- ()35. 有關自動體外心臟電擊去顫器(AED)安心場所之認證作業原則的描述，以下何者錯誤？
- (A)是依據公共場所必要緊急救護設備管理辦法第 12 條規定，由衛生福利部所訂定。
 - (B)由直轄市、縣(市)地方衛生主管機關辦理。
 - (C)審查結果通過者，由辦理單位核發證書，其資格有效期限為 4 年。
 - (D)經評定公告為通過之場所，在有效期限內，辦理單位應每年不定期檢查或抽查通過認證之安心場所設置之設備及教育訓練情形。
- ()36. 王小姐，37 歲，設籍臺南市民，領有小兒麻痺證明，欲參加臺南市「行動醫院、全民健檢」活動，請問下列何者是王小姐可每年一次免費接受檢查的項目？
- (A)成人健康檢查。
 - (B)口腔黏膜檢查。
 - (C)乳房 X 光攝影。
 - (D)糞便潛血檢查。
- ()37. 在三段五級預防中，下列哪一項不屬於第二級預防？
- (A)按時接受預防接種。
 - (B)避免接觸致癌物質。
 - (C)給予特殊營養。
 - (D)遺傳優生保健。

- ()38. 陳女士，39 歲，在某次衛生所舉辦的社區活動中，參與衛生教育講座、接受癌症篩檢，以下敘述何者錯誤？
- (A)陳女士騎機車戴安全帽前來參加活動以降低事故傷害，在三段五級中屬於第二級預防。
 - (B)陳女士可每年免費一次接受子宮頸抹片檢查，但建議兩次篩檢需間隔六個月以上。
 - (C)子宮頸抹片檢查在三段五級預防中屬於第二級預防。
 - (D)陳女士參與此次活動無法免費接受乳房 X 光攝影檢查。
- ()39. 有 500 名動態生活型態者，及 480 名靜態生活型態者，參與 5 年的研究計畫，在此期間，有 25 名動態生活型態者，及 30 名靜態生活型態者被診斷罹患 A 疾病。靜態生活型態者較動態生活型態者罹患 A 疾病的危險對比值(risk rate ratio)為何？
- (A)1.25。
 - (B)1.15。
 - (C)0.87。
 - (D)0.8。
- ()40. 若想了解平安社區 65 歲以上人口的冠心症死亡率，應收集哪些資料？
① 年中總人口數；② 年中 65 歲以上總人口數；③ 全年 65 歲以上死亡人數；④ 全年 65 歲以上冠心症死亡人數。
- (A)②④
 - (B)②③
 - (C)①②
 - (D)③④
- ()41. 護理師想在平安社區辦理衛生教育講座，其第一步工作為何？
- (A)評估平安社區民眾的需求和問題。
 - (B)設定衛生教育講座的教學目標。
 - (C)選擇適合的教學方法。
 - (D)依據政府宣導主題推動計畫。

題組(42-44)：下表為美滿社區 106 年的年中人口資料：

	總計	男	女
0-4 歲	21	11	10
5-14 歲	48	25	23
15-44 歲	243	126	117
45-49 歲	40	21	19
50-64 歲	141	73	68
65-74 歲	57	27	30
75 歲	56	23	33
總計	606	306	300

- () 42. 該社區性別比(sex ratio)，以下何數值較為正確？
- (A)0.87。
(B)0.98。
(C)1.02。
(D)1.10。
- () 43. 該社區之依賴人口指數(dependent index)，以下何數值較為正確？
- (A)11.39%。
(B)26.65%。
(C)30.03%。
(D)42.92%。
- () 44. 該社區之老化指數，以下何數值較為正確？
- (A)163.77%。
(B)22.92%。
(C)26.71%。
(D)18.65%。
- () 45. 簡老先生是位失智症患者，有短期記憶障礙、猜忌和誤食食物等問題，由媳婦照顧日常生活，生病前兩人關係不佳，護理師訪視時，案媳憤怒表示公公故意與他作對，跟其他親友告狀媳婦沒有給食物吃，護理師採取的護理措施，下列何者錯誤？
- (A)向案媳解說疾病特性。
(B)建議案媳將危險及不可食用的物品收好。
(C)轉介案媳參加照顧者支持團體。
(D)勸導簡老先生體諒媳婦的辛苦。

- ()46. 李女士，43 歲，有吸菸的習慣，其外祖母因乳癌過世，護理師給予衛教，下列何者錯誤？
- (A)每年可免費接受一次子宮頸抹片檢查。
(B)每二年可免費接受一次乳房 X 光攝影檢查。
(C)建議乳房 X 光攝影檢查應避開生理期期間。
(D)每年可免費接受一次口腔黏膜檢查。
- ()47. 護理師對社區罹患代謝症候群的民眾進行衛生教育，下列內容何者正確？①養成運動的習慣 ②強調透過運動可以降低高密度脂蛋白 ③養成每日五蔬果的概念 ④強調每日攝取鹽分在 10 毫克以下。
- (A)①②
(B)①③
(C)②④
(D)③④
- ()48. 以下何種傳染病，其傳播途徑以飛沫傳染為主？①麻疹 ②日本腦炎 ③茲卡病毒 ④水痘。
- (A)①④
(B)①③
(C)②④
(D)③④
- ()49. 以下何種傳染病可以垂直感染的方式傳染？①梅毒 ②愛滋病 ③肺結核 ④傷寒 ⑤B 型肝炎。
- (A)①②⑤
(B)②④⑤
(C)②③⑤
(D)①③⑤
- ()50. 為維護中老年人健康，早期發現慢性病、早期介入及治療，衛生福利部國民健康署提供免費成人健康檢查，服務內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等項目，下列敘述何者錯誤？
- (A)40-64 歲民眾每 3 年一次。
(B)罹患小兒麻痺且年齡在 35 歲以上者每年一次。
(C)50 歲以上原住民每年一次服務。
(D)65 歲以上民眾每年一次服務。