

臺南市北門區衛生所藥師甄選筆試試題

考試日期：112年9月19日 時間：09:00~10:00 編號：_____

選擇題 (100%)：共80題，每題1.25分，單一選擇，答錯不倒扣

- 下列何者是 partial agonist 的性質？
(A)藥理作用會受 antagonist 拮抗 (B)作用位置是在受體的 allosteric site
(C)不具有 intrinsic activity (D)增加濃度可以達到 full agonist 的作用
- 依據衛生福利部國民健康署公告，5項健康危險因子中，有3項或以上稱為「代謝性症候群」，下列何者非該5項危險因子之一？
(A)腹部肥胖（男性腰圍大於90公分、女性腰圍大於80公分） (B)高密度脂蛋白膽固醇過高
(C)三酸甘油酯過高 (D)血壓偏高
- 某新藥之臨床試驗計畫書依法應向下列何者申請審查核准？
(A)衛生福利部醫事司 (B)衛生福利部
(C)衛生福利部中央健康保險署 (D)衛生福利部食品藥物管理署
- 次硝酸鈹懸浮液配方含有甲基纖維素、Tween 80與磷酸鉀等；於此配方下列敘述何者正確？
(A)甲基纖維素為凝絮化劑 (B)Tween 80為濕潤劑
(C)磷酸鉀為網架式媒液 (D)磷酸鉀可增加 zeta 電位
- 某抗生素之最低抑菌濃度 (MIC) 為 $10 \mu\text{g/mL}$ ，當血中濃度高於 $50 \mu\text{g/mL}$ 時有肝毒性之疑慮。若欲使用 HPLC 監測其療效濃度時，下列測試濃度範圍何者最恰當？
(A) $0.01 \sim 10000 \mu\text{g/mL}$ (B) $0.1 \sim 1000 \mu\text{g/mL}$
(C) $1 \sim 100 \mu\text{g/mL}$ (D) $20 \sim 50 \mu\text{g/mL}$
- 有關 glycerol 之敘述，下列何者錯誤？
(A)可做為外用製劑之溶媒 (B)不具防腐劑之功能
(C)可做為內服製劑之穩定劑與矯味劑 (D)propylene glycol 之黏稠度較 glycerol 低
- 有關降血脂藥物 niacin 之作用機制與副作用，下列敘述何者錯誤？
(A)能降低三酸甘油脂 (triglycerides)、LDL 及 Lp(a) (B)能促進 HDL 分解代謝
(C)能抑制肝臟分泌 VLDL，進而減少 LDL 產生 (D)可能會增加血中尿酸濃度
- 有關藥品與其 antidote 配對，下列何者正確？
(A)lorazepam—naloxone (B)beta-blocker—glucagon
(C)morphine—flumazenil (D)heavy metal—calcium gluconate
- 下列何種溶劑可以用於非水鹼滴定法？
(A)硝酸 (B)乙酸 (C)吡啶 (D)乙醇
- 57歲女性，肝腎功能正常，因 acute respiratory exacerbation in chronic bronchitis 以 oral antibiotic 治療。下列何者之劑量與頻次最適當？
(A)amoxicillin / clavulanate 875 mg / 125 mg QD (B)doxycycline 200 mg BID
(C)azithromycin 500 mg QD (D)moxifloxacin 400 mg BID
- 下列藥物中，何者最可能會抑制代謝該藥物本身的肝臟酵素，長期服用需注意調整劑量？
(A)carbamazepine (B)clopidogrel (C)phenytoin (D)rifampin
- 懷孕10週的婦女發生 acute uncomplicated urinary tract infection，下列抗生素選擇何者正確？
(A)nitrofurantoin (B)doxycycline (C)trimethoprim-sulfamethoxazole (D)ciprofloxacin
- 依中華藥典對阿片酊 (opium tincture) 與阿片樟腦酊 (camphorated opium tincture) 之敘述，下列何者正確？
(A)兩者之配方均以切細之阿片直接作為製備原料
(B)阿片酊所含 morphine 濃度，較阿片樟腦酊高
(C)阿片酊為口服之酊劑，阿片樟腦酊為局部外用酊劑
(D)兩者均需置於密蓋阻光容器中，於冷暗處保存
- 下列敘述何者錯誤？
(A)藥商歇業，應向當地衛生主管機關申請，並將其所領藥商許可執照及藥品許可證一併繳銷
(B)新設之國產藥品製造業者，其硬體設備及衛生條件，應符合藥物製造工廠設廠標準及工廠管理輔導法之規定，並由工業主管機關及直轄市或縣(市)衛生主管機關檢查之；其軟體設備及衛生條件，應符合藥品優良製造準則之規定，並由中央衛生主管機關檢查之
(C)藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央衛生主管機關核准，並向傳播業者送驗核准文件。其有效期間為一年，期滿仍需繼續廣告者，得向地方衛生主管機關申請展延之；每次展延之期間，不得超過一年
(D)凡申請為藥商者，應申請直轄市或縣(市)衛生主管機關核准登記，繳納執照費，領得許可執照後，方准

營業；其登記事項如有變更時，應辦理變更登記

15. 未經當地衛生主管機關核准擅自銷燬管制藥品者，處罰鍰？
(A) 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰 (B) 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰
(C) 15 萬元以上 75 萬元以下罰鍰 (D) 3 萬元以上 100 萬元以下罰鍰
16. 有關次乙酸鋁溶液 (aluminum subacetate topical solution) 之敘述，下列何者錯誤？
(A) 別名為 Burow's solution (B) 由硫酸鋁和乙酸及沉澱性碳酸鈣反應而成
(C) 可加 0.9% 硼酸使製劑穩定 (D) 用於局部外用，當洗劑或潤濕劑
17. 某藥廠發明可治療憂鬱症的新藥，其有無可能在八里療養院，進行臨床試驗？
(A) 否；該療養院非屬教學醫院，與現行法規之規定不符
(B) 是；若該療養院經衛生福利部同意，可施行此臨床試驗
(C) 是；經該療養院之倫理委員會認證通過，即可施行
(D) 是；若該療養院與醫學中心合作，則可使用該醫學中心之受試者同意書，施行此臨床試驗
18. 下列何者為防範社交工程的具體措施？
(A) 遇到任何要求提供個人資訊的情況不用提高警覺，隨意就好。
(B) 收件時，不需要查看寄件人名稱來確認電子郵件的真實性。
(C) 在下載檔案之前，縱然來自看似可靠的來源，仍務必再次確認。
(D) 看到任何連結應直接點擊查看內容，確認真偽。
19. 醫師將所開處方箋交予病人，病人持處方箋可至下列何處調劑？
(A) 藥房 (B) 藥局 (C) 藥商 (D) 藥粧店
20. 關於定量核磁共振 (qNMR) 分析法的應用敘述，下列何者錯誤？
(A) 對製劑中低含量成分亦具有高靈敏度
(B) 通常透過測定藥物中特定氫訊號與內部標準品比較
(C) 成分含量與訊號積分面積成正比
(D) 不需對照標準品亦可以測定藥品的純度
21. 下列何者服用後不可立即躺下，須維持上身直立至少半小時？
(A) allopurinol (B) albuterol (C) albendazole (D) alendronate
22. 下列何者非醫療器材？
(A) 隱形眼鏡沖洗液 (B) 體脂機 (C) 體重機 (D) 針灸針
23. 依毒品危害防制條例所稱之毒品，係指具有何種特性之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品，下列何者為非？
(A) 成癮性 (B) 耐受性 (C) 濫用性 (D) 對社會危害性
24. 有關 azithromycin oral suspension 用粉劑，下列敘述何者錯誤？
(A) 泡製前應先搖動裝有粉劑之藥瓶 (B) 泡製後之懸液劑可於室溫下保存 5 天
(C) 可用於治療下呼吸道感染 (D) 建議兒童飯後或喝牛奶時一起使用
25. 為避免病人產生 refeeding syndrome，在接受 TPN 的第一週，須每日監測下列檢驗值，但何者除外？
(A) 血磷 (B) 血糖 (C) 血鈉 (D) 血鎂
26. 抗凝血 (anticoagulant) 口服藥物 rivaroxaban，其主要作用在於抑制下列何種凝血因子？
(A) factor Xa (B) factor VIIa (C) factor IV (D) factor IIa
27. 下列何者為製備口服錠劑 (tablet) 之稀釋劑 (diluent)？
(A) mannitol (B) polyvinylpyrrolidone (C) microcrystalline cellulose (D) modified starch
28. 某診所藥師在執行業務時，因家人發生嚴重意外，須暫時離開藥局趕赴處理。下列敘述何者最適當？
(A) 藥師不在營業場所執行業務時，應於門口懸掛明顯標示。若該標示被人取掉，藥師應負舉證之責，始可免責
(B) 經診所醫師同意後，可委請資深護理人員暫代業務，但不得包括麻醉藥品調劑
(C) 得請診所休假醫師，依藥事法第 102 條，經報備主管機關後，始可代為執行調劑業務
(D) 若由非護理人員代理調劑業務時，如該藥師確實知情，則此藥師處以罰款 6~30 萬元，該代理人員另以違反醫療法處罰
29. 今日資訊網路詐騙技術層出不窮，養成好的電腦與網路使用習慣，可以防範在網路上洩漏個人資料，請問下列哪些方法可以有效預防？
① 盡量使用公用電腦或無線網路 ② 切勿在電子郵件內提及銀行和信用卡相關資訊 ③ 安裝防毒軟體並定期更新 ④ 使用較複雜的密碼組合
(A) ①③ (B) ①②③ (C) ②③④ (D) ①③④
30. 明膠膠囊殼內，添加二氧化鈦之主要目的為何？
(A) 具彈性 (B) 抗氧化 (C) 防潮性 (D) 遮光性
31. 服用抗憂鬱藥物 (anti-depressants) 的病人應避免併用下列何種中草藥，以防止 serotonin syndrome 的發生？
(A) St. John's wort (B) milk thistle (C) saw palmetto (D) olive leaf

32. 有關 antiplatelets 用於 acute coronary syndrome (ACS) 的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 於 ACS 發生時新使用 ticagrelor，須給與速效劑量 180 mg
 (B) prasugrel 須轉換為 active metabolites 後，方可結合至 platelets 之 P2Y₁₂ ADP 受體，抑制 platelet aggregation
 (C) 給與 aspirin 速效劑量時，腸溶錠和膜衣錠的作用速度相當
 (D) 與 clopidogrel 相比，prasugrel 和 ticagrelor 的 antiplatelet 作用較強
33. 下列何類藥品標籤不需要另外以中文加註警語及足以警惕之圖案或顏色？
 (A) mifepristone (B) propofol
 (C) methylephedrine (D) morphine
34. 衛生局稽查發現，小明在自家工廠製造仿真品的 A 藥品，此仿真品之 A 藥品係屬藥事法所規定之何種藥品？
 (A) 偽藥 (B) 劣藥 (C) 禁藥 (D) 毒劇藥
35. 濃度為 0.4% (w/v) 之氫氧化鈉水溶液，其 pH 值約為何？(氫氧化鈉分子量 = 40 g/mol)
 (A) 1 (B) 11 (C) 3 (D) 13
36. 政府推行新的服務措施時，往往會舉辦說明會，請問這樣是符合哪項精神？
 (A) 創新服務方式，整合服務資源。 (B) 提升服務品質，深化服務績效。
 (C) 豐富服務資訊，促進網路溝通。 (D) 便捷服務程序，確保流程透明。
37. 對於高效液相層析法 (HPLC) 的描述，下列何者錯誤？
 (A) 固定相充填劑的粒徑愈小，分離效果愈佳
 (B) 層析管柱長度變為 2 倍，則滯留時間約變為 2 倍
 (C) 流速相同時，減小層析管柱內徑可提高分離效果
 (D) 固定相粒徑愈大，分離的最佳線性流速 (linear velocity) 愈低
38. 下列何者為最常用的 antifungal preservative？
 (A) butylparaben (B) monothioglycerol (C) butylated hydroxyanisole (D) sodium formaldehyde
39. 出納人員在存款餘額內支付之款項，除法令另有規定者外，應一律簽發抬頭支票，票面劃平行線二道，並註明禁止背書轉讓。但具備何項條件者，得予註銷平行線二道或禁止背書轉讓？
 (A) 金額在新台幣五十萬元以下 (B) 金額在新台幣一百萬元以下
 (C) 採郵寄方式 (D) 受款人屬政府機關
40. 8 歲男童，120cm，23kg，有氣喘病史，長期使用 fenoterol metered aerosol 100 mcg IH PRN。今因氣喘急性發作，血氧飽和度降至 94%，入急診治療，下列何者為急性處置首選？
 (A) aminophylline injection, loading dose 5.7 mg/kg IF 30 min, then 1 mg/kg/hr cIF, 再依 theophylline Blood concentration 調整劑量
 (B) salbutamol sulfate nebulas 2.5 mg IH Q20min, for 3 doses
 (C) epinephrine 2 mg SC Q20min, for 3 doses
 (D) salmeterol xinafoate / fluticasone propionate evohaler 250/25 mcg 2 puffs IH PRN, Q2H, max 12 doses/day
41. 血壓值超過多少，就可能有代謝症候群的風險？
 (A) 120/80 (B) 130/85 (C) 140/90 (D) 150/95
42. 關於藥品安定性的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 零級降解速率常數的單位為 h (B) 常見的是零級或一級降解
 (C) 零級降解的分解速率與反應物的濃度無關 (D) 一級降解的半衰期和速率常數呈反比
43. 何女士 57 歲，因發燒、咳嗽有黃痰，胸部 X 光片顯示左下葉肺炎而住院，過去病史有心臟 QT 波延長達 503 msec。下列抗生素治療何者最適當？
 (A) cefotaxime + doxycycline (B) cefuroxime + clarithromycin
 (C) ciprofloxacin + azithromycin (D) levofloxacin
44. 對於資訊中心的安全防護措施，下列那一項不正確？
 (A) 資訊中心的電源設備包含穩壓器及不斷電系統
 (B) 機房應選用耐火、絕緣、散熱性良好的材料
 (C) 四份以上的資料備份，並一起收妥以防遺失
 (D) 需要資料管制室，做為原始資料的驗收、輸出報表的整理及其他相關資料保管
45. 依中華藥典之規定，吸入氣化噴霧劑中，投藥粒子之平均大小直徑應控制在若干 μm 以下為適當？
 (A) 10 (B) 5 (C) 1 (D) 0.1
46. 下列何種方法較適合用於水分含量不超過 0.5% 檢品之含水量測定？
 (A) 乾燥減重法 (B) 液相層析法 (C) 甲苯蒸餾法 (D) 費氏 (Karl Fischer) 測定法
47. 藥師若以藥廠原包裝交付病人口服藥品，藥袋上不須額外標示下列那一項目？
 (A) 藥局的名稱及地址 (B) 病人姓名 (C) 藥品批號 (D) 調劑日期
48. 依毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法規定，無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品者，需接受一定時數之毒品危害講習，未依規定完成講習時數者，該如何處置？

- (A)移送檢調單位 (B)處以怠金 (C)處以怠金並仍須完成講習時數 (D)入監服刑
49. 25 歲王先生，健康狀況良好，因左小腿一傷口發紅、疼痛就醫，診斷為 mild cellulitis。下列敘述何者正確？
 (A)應先進行血液細菌培養，再決定適用的抗生素 (B)建議以口服 dicloxacillin 500 mg Q6H 治療
 (C)口服藥外，建議加上外用 mupirocin 治療 (D)建議治療期間為 14 天
50. 以高效液相層析法分析 amylbenzene、propylbenzene 及 toluene 的混合物，若以 C18 管柱為固定相，甲醇和水的混合溶液為移動相，則下列敘述何者錯誤？
 (A)增加移動相中的甲醇含量會降低此三者的 capacity factor (K')
 (B)提升層析管柱的溫度，會使 capacity factor (K') 降低
 (C)移動相中加入 0.1% 的乙酸，此三者的 capacity factor (K') 幾乎不變
 (D)滯留時間由長到短依序為 toluene、propylbenzene、amylbenzene
51. 醫療機構每年幾月前需申報前一年管制藥品？
 (A) 1 月 (B) 2 月 (C) 3 月 (D) 6 月
52. 依據藥局設置作業注意事項，關於藥局之設置，下列何者正確？
 (A)藥局總面積至少 18 平方公尺之作業區，包含調劑處所、候藥區、受理處方箋與非處方藥品供應區、藥事諮詢服務區、廁所及倉庫
 (B)藥局總面積至少 18 平方公尺之作業區，包含調劑處所、候藥區、受理處方箋與非處方藥品供應區及藥事諮詢服務區
 (C)藥局總面積至少 16 平方公尺之作業區，包含調劑處所、候藥區、受理處方箋與非處方藥品供應區、藥事諮詢服務區、廁所及倉庫
 (D)藥局總面積至少 16 平方公尺之作業區，包含調劑處所、候藥區、受理處方箋與非處方藥品供應區及藥事諮詢服務區
53. 下列有關降血糖藥 metformin 之敘述，何者錯誤？
 (A)可以促進 insulin 自胰臟 β 細胞釋放 (B)可以抑制肝臟糖質新生作用 (gluconeogenesis)
 (C)為細胞內 AMP-activated protein kinase 活化劑 (D)最常見的副作用為腸胃道不適之症狀
54. 70 歲王先生，有姿勢性低血壓，下列何者與此相關性最小？
 (A)nebivolol 5 mg QD (B)doxazosin 4 mg HS
 (C)carvedilol 12.5 mg BID (D)isosorbide 5-mononitrate 20 mg BID
55. 資訊安全的性質為
 (A)既不是技術問題，也不是管理問題 (B)純屬技術問題，無關管理
 (C)純屬管理問題，無關技術問題 (D)不但是技術問題，且是管理問題
56. 7 歲女童，生活正常，無已知外傷，體溫 38°C 且大腿持續疼痛 3~4 天，走路異常。理學檢查左股骨遠端有觸痛，膝關節無腫脹。影像檢查符合左股骨骨髓炎，ESR 及 CRP 高，血液培養初步報告 S. aureus，藥品敏感性測試結果未知。下列處置何者最適當？
 (A)amoxicillin 25 mg/kg PO Q6H (B)oxacillin 50 mg/kg IV Q6H
 (C)vancomycin 15 mg/kg IV Q6H (D)等藥品敏感性測試結果再給藥
57. 一位 HIV 檢測陽性，酗酒及胸部 X 光檢驗結果高度疑似肺結核之急診病患，下列有關此病患給藥的處置何者錯誤？
 (A)以 rifabutin, isoniazid, pyrazinamide 及 ethambutol 開始治療
 (B)HIV 治療用藥 atazanavir 可以與 rifampin 同時使用
 (C)若用 rifabutin 可以與 dolutegravir 同時使用
 (D)此病患使用 isoniazid 與 pyrazinamide 產生肝毒性風險會增加
58. 某藥品 Q_{10} 值為 2，其在冰箱 (5°C) 的架儲期為 96 小時，估計其在室溫下 (25°C) 的架儲期為若干小時？
 (A)6 (B)12 (C)24 (D)48
59. 有關「丁基原啡因」，下列何者為非？
 (A)「丁基原啡因」舌下錠與美沙冬一樣，可用來治療海洛因成癮。
 (B)因藥效時間較長，視醫師評估及個人狀況可以延長 2-3 天服藥一次。
 (C)屬二級管制藥品。
 (D)可限量攜回家服用，最多可帶 2 週處方藥量。
60. 某氣化噴霧劑使用 propellant 134a: propellant 12 = 40:60 (w/w %) 作為推動劑。參考下表計算此混合推動劑所產生之壓力為若干 psig?
 Chemical name 分子量 飽和蒸氣壓 (21°C)
 dichlorodifluoromethane 120.9 84.9
 tetrafluoroethane 102 71.1
 (A)42.3 (B)56.3 (C)77.1 (D)78.9
61. 下列何者調劑時，須提醒老年人可能出現尿滯留的現象？
 (A)aspirin (B)diphenhydramine

- (C)omeprazole (D)nifedipine
62. 各機關出納管理單位，對於存管之現金、票據、有價證券、自行收納款項收據及其他保管品等，應作定期與不定期之盤點；另由會計單位至少多久辦理監督盤點一次？
 (A)每2年至少監督盤點1次 (B)每年至少監督盤點1次
 (C)每半年至少監督盤點1次 (D)沒有限制次數
63. 有關發泡顆粒之敘述，下列何者錯誤？
 (A)單獨使用檸檬酸易成黏稠混合物，致難以造粒
 (B)單獨使用酒石酸時，其顆粒易失去堅固性而易碎
 (C)以融合法製備時，為利用檸檬酸的結晶水作為黏合劑
 (D)以濕式法製備時，須添加碳酸氫鈉為黏合劑
64. 新冠肺炎疫苗經過下列何單位審查後緊急專案核准製造輸入？
 (A)行政院 (B)財團法人醫藥品查驗中心
 (C)衛生福利部疾病管制署 (D)衛生福利部
65. 癌症篩檢服務屬於公共衛生三段五級的哪一級預防措施？
 (A)第五級 (B)第四級 (C)第三級 (D)第二級
66. 下列抗生素中，何者無法用於治療 methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) 之感染？
 (A)vancomycin (B)dalbavancin (C)ceftaroline (D)aztreonam
67. 有關 isoniazid 使用在結核病治療之敘述，下列何者錯誤？
 (A)為預防周邊神經炎副作用，所有使用者均應併用 pyridoxine
 (B)可能有肝炎、神經炎、皮疹等副作用
 (C)孕婦可以使用
 (D)若與 carbamazepine 併用，isoniazid 會抑制其代謝而使血中濃度增加
68. Angiotensin II receptor (AT₁ receptor) inhibitors 的降血壓機制，不包括下列何者？
 (A)抑制 bradykinin 代謝 (B)減少前負荷 (preload)
 (C)減少交感神經活化 (D)抑制血管收縮
69. 有關藥物產品的架儲期，下列敘述何者錯誤？
 (A)架儲期可做為藥品之品管指標
 (B)過了架儲期，就能確認效價不足
 (C)架儲期是由藥物安定性試驗所推定
 (D)於藥品容器標籤上所規定之儲存條件下，才能確保其架儲期
70. 關於間諜程式(Spyware)的描述，下列何者有誤？
 (A)木馬程式(Trojan Horse)目的是破壞電腦資料，造成被感染電腦使用者的不便
 (B)後門程式(Backdoor)就是間諜程式
 (C)間諜程式和廣告軟體一樣，通常透過木馬程式，在使用者未察覺的情況下，自行安裝至電腦中
 (D)為避免閱讀郵件而感染間諜程式，最好關閉電子郵件軟體的預覽功能
71. 碘價與脂肪酸的何種性質有關？
 (A)不飽和度 (B)游離度 (C)溶解度 (D)螯合度
72. 小新在藥品公司買了2瓶合法之指示藥品，沿街到處叫賣，依藥事法之規定，其行為應屬下列何者？
 (A)未申請藥商許可執照販賣藥品 (B)未依處方箋調劑藥品
 (C)未經查驗登記販賣藥品 (D)藥商僱用之推銷員未經登記，執行推銷工作
73. 領藥時，下列何者不須領受人憑身分證明簽名領受？
 (A) morphine (B) alprazolam (C) fentanyl (D) flunitrazepam
74. 有關栓劑 (suppository) 之敘述，下列何者錯誤？
 (A)栓劑基劑對黏膜應不具刺激性 (B)可可脂基劑與體液可互溶
 (C)polyethylene glycol 可做為栓劑之水溶性基劑 (D)適合用於兒童和老年人
75. 依毒品危害防制條例，毒品依其特性分為四級，請問下列何者為是？
 (A)笑氣 (N₂O) 是第四級毒品 (B)罌粟是第一級毒品
 (C)古柯鹼是第二級毒品 (D)以上皆非
76. 下列何種玻璃類型最適合用於製作胰島素注射筆或卡式管，用以充填胰島素？
 (A)type I (B)type II (C)type III (D)type IV
77. 國民健康署推行之 ICOPE 評估，下列何者非用藥評估的內容？
 (A)每天使用的藥物是否 10 種(含)以上
 (B)服用的藥品中是否包含止痛藥、幫助睡眠用藥
 (C)是否會自行購買保健食品或營養補充品
 (D)是否因為服用藥品而發生平衡感改變、睏倦、眩暈、低血壓或口乾舌燥等症狀
78. 陳同學 10 歲，每天均有 asthma 症狀，且一天之中需使用數次 salbutamol IH 緩解症狀，每天晚上也幾乎因症狀發作而醒來。下列何項藥物治療最適當？

- (A)medium-dose budesonide IH 併用 montelukast PO
- (B)high-dose budesonide IH 併用 formoterol IH
- (C)high-dose fluticasone IH 併用 tiotropium IH
- (D)high-dose fluticasone IH 併用 omalizumab SC

79. 關於汞中毒的敘述，下列何者錯誤？

- (A)可用 unithiol, dimercaprol 或 succimer 治療
- (B)慢性汞中毒常引起中樞神經的毒性
- (C)急性汞中毒常因甲基汞 methylmercury 引起
- (D)急性汞中毒可能引起肺炎

80. 關於紫外光／可見光光譜法的敘述，下列何者錯誤？

- (A)葡萄糖亦具紫外光吸收
- (B)可用於測定化合物的 pKa
- (C)以 UV 進行含量測定時，須考慮賦形劑之影響
- (D)麻黃素 (ephedrine) 會與亞鐵離子形成錯合物，產生紅移 (red shift) 現象