

臺南市南化區衛生所藥師公開甄選筆試試題

考試日期：115 年 3 月 11 日 時間：10：00～11：00 入場編號：_____

◆本試題為雙面印刷，共80題，每題1.25分，皆為單選題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，答錯不倒扣；複選作答者，該題不予計分。

◆須用藍色或黑色原子筆在答案卷上依題號作答，於本試題上作答者，不予計分。

- 下列bisphosphonates類藥物中，何者只需要每年靜脈注射5 mg一次，即可有效治療骨質疏鬆症？
(A) alendronate (B) risedronate (C) zoledronate (D) ibandronate
- 下列抗心律不整藥物中，可能導致心電圖QT interval延長，引起心律不整副作用之機制為何？
(A) propafenone，抑制鈉離子通道，但會導致INa slow inactivation，產生delayed afterdepolarizations
(B) sotalol，拮抗 β -adrenergic receptor，產生delayed afterdepolarizations
(C) amiodarone，抑制鉀離子通道，尤其是IKr，產生early afterdepolarizations
(D) adenosine，拮抗A1 receptor，抑制鉀離子通道，產生early afterdepolarizations
- 下列利尿劑含有之雜環結構，何者錯誤？
(A) furosemide：furan
(B) methyclothiazide：benzothiadiazine-1,1-dioxide
(C) metolazone：quinolin-4-one
(D) acetazolamide：thiadiazole
- 下列有關etodolac之敘述，何者錯誤？
(A) 選擇性抑制COX-2高於COX-1，因此相對一般NSAID的腸胃副作用較低
(B) 主要的活性來自於其S-(+)異構物
(C) 結構具有furanocarboxylic acid
(D) 其抗炎活性比indomethacin低
- 一位50歲的男性躁鬱症患者，同時具有腎絲球腎炎（glomerulonephritis）的病史。因其躁鬱症非常嚴重需要接受藥物的治療，下列那一種藥物最適合其使用？
(A) imipramine (B) carbamazepine (C) lithium carbonate (D) buspirone
- 關於抗黴菌azoles類製劑，下列何者進入腦脊髓液（cerebrospinal fluid）的效果最佳？
(A) ketoconazole (B) itraconazole (C) fluconazole (D) voriconazole
- 下列何者具有抑制腎上腺類固醇（adrenal steroid）合成作用，可用於治療嚴重性Cushingsyndrome？
(A) etomidate (B) fludrocortisone (C) triamcinolone (D) bromocriptine
- 下列何種藥物較不會引起便秘之副作用？
(A) misoprostol (B) ondansetron
(C) sucralfate (D) aluminum containing antacids
- Chlorpromazine經下列何種代謝反應，而失去抗精神疾症活性？
(A) N-mono-demethylation (B) N,N-di-demethylation
(C) aromatic hydroxylation (D) sulfoxidation
- 蛋白酶抑制劑lopinavir併用低劑量ritonavir之主要目的為：
(A) 達到synergistic效果 (B) 增加lopinavir之安定性
(C) 減緩lopinavir之代謝 (D) 增加lopinavir之吸收
- 下列何者為雌激素受體部分致效劑（estrogen receptor partial agonist），但可以拮抗雌激素於下視丘之負回饋作用，而促進腦下垂體大量釋放性促素（gonadotropins）？
(A) anastrozole (B) clomiphene (C) danazol (D) flutamide
- Sacubitril併用valsartan用於治療心衰竭，可降低死亡率及再住院率，關於其藥理作用機制之敘述，下列何者正確？
(A) 產生血管放鬆作用及減少體液滯留，減少心臟前負荷（preload）與後負荷（afterload）
(B) sacubitril能直接產生血管放鬆作用，且能促進brain natriuretic peptide及atrial natriuretic peptide之生合成，增強血管放鬆作用
(C) valsartan能抑制angiotensin II converting enzyme，產生血管放鬆作用
(D) valsartan能抑制angiotensin II活化aldosterone receptor，產生血管放鬆作用

13. 下列何者不是擬副交感神經興奮藥物 (cholinomimetic drug) 的治療用途？
 (A) 青光眼 (glaucoma) (B) 重症肌無力 (myasthenia gravis)
 (C) 阿茲海默症 (Alzheimer disease) (D) 帕金森氏症 (Parkinson disease)
14. 鎮靜安眠藥物 benzodiazepine 作用於 GABAA 受體，主要調控下列何種離子的通透性？
 (A) 鈣離子 (B) 鈉離子 (C) 氯離子 (D) 鉀離子
15. 下列藥物對 COX-2 抑制作用的強弱順序，何者正確？① aspirin ② diclofenac ③ ibuprofen ④ indomethacin
 (A) ③②①④ (B) ④②①③ (C) ③④②① (D) ②④③①
16. 下列有關降血脂藥物 rosuvastatin 之敘述，何者錯誤？
 (A) 由肝臟 CYP3A4 代謝，具首渡效應 (B) 主要作用標的為 HMG-CoA reductase
 (C) 肌病變 (myopathy) 為重要副作用 (D) 可降低血中 LDL 的濃度
17. 有關 sacubitril 用於治療心衰竭之藥理作用，下列敘述何者正確？
 (A) 為前驅藥 (prodrug)，能抑制 neprilysin 被降解
 (B) 能促進 brain natriuretic peptide 和 atrial natriuretic peptide 生合成，並促進 angiotensin II 和 bradykinin 降解，減少心臟前負荷 (preload)，減少心臟重塑
 (C) 與 valsartan 併用時，能促進血管擴張作用，減少心臟前負荷 (preload) 或後負荷 (afterload)，減少心臟重塑
 (D) 降血壓藥物 aliskiren 常與 sacubitril 併用於治療心衰竭病人
18. 下列何者為擬交感神經作用劑 midodrine 最主要之臨床用途？
 (A) 高血壓 (hypertension) (B) 氣喘 (asthma)
 (C) 青光眼 (glaucoma) (D) 姿勢性低血壓 (orthostatic hypotension)
19. 下列有關全身麻醉劑的敘述，何者錯誤？
 (A) 脂溶性越高的麻醉劑，其產生麻醉作用所需要的濃度越低
 (B) 麻醉劑的效價 (potency) 與最低肺泡麻醉濃度 (minimum alveolar anesthetic concentration, MAC) 呈反比
 (C) 低血液溶解度的氣體麻醉劑，其恢復期較長；反之，高血液溶解度的氣體麻醉劑恢復期較短
 (D) ketamine 會刺激交感神經活性，使得心跳及血壓上升
20. 下列關於 erythropoietin (EPO) 的敘述，何者錯誤？
 (A) 由腎臟產生的 glycoprotein
 (B) 能抑制骨髓中的 erythroid progenitors，減少紅血球產生
 (C) 結構中的雙硫鍵及 glycosylation 位置與其生物活性相關
 (D) 可治療慢性腎衰竭引起的貧血
21. 下列關於 prodrug 之敘述，何者最適當？
 (A) 因有 first-pass effect，口服吸收效果差 (B) 在血中與白蛋白 (albumin) 結合度高
 (C) 在體內之代謝產物具有生物活性 (D) 代謝物易由腎臟排出，半衰期短
22. 下列抗生素中，何者抗菌機轉不是抑制細菌之蛋白質合成，以達到 bacteriostatic 或 bactericidal effects？
 (A) quinupristin-dalfopristin (B) tedizolid
 (C) tigecycline (D) fosfomycin
23. 關於選擇性第二型環氧酶 (cyclooxygenase-2) 抑制劑之敘述，下列何者錯誤？
 (A) 不易產生胃潰瘍 (B) 仍具有腎毒性的副作用
 (C) celecoxib 受 CYP2C9 代謝 (D) 不易引起血管栓塞的風險
24. 下列何者可透過阻斷鉀離子通道，而用於多發性硬化症 (multiple sclerosis) 的治療？
 (A) glatiramer (B) ocrelizumab (C) dalfampridine (D) fingolimod
25. 下列關於 ezetimibe 的敘述，何者正確？
 (A) 含 azetidinone 結構
 (B) 作用標的為 HMG-CoA 還原酶
 (C) 與 statin 類藥物併用時，會增加橫紋肌溶解症之風險
 (D) 可與制酸劑一起服用
26. 下列質譜儀，何者因不易得到準確質量數，而不適用於藥物不純物之結構鑑定？
 (A) 四極柱質譜儀 (quadrupole MS) (B) 飛行式質譜儀 (time of flight MS)
 (C) 傅立葉轉換質譜儀 (Fourier transform MS) (D) 磁場式質譜儀 (magnetic sector MS)
27. 對於高極性化合物，下列質譜測定法中何者最不易獲得分子量資訊？

- (A) 高速原子撞擊法 (FAB) (B) 電灑游離法 (ESI)
(C) 化學游離法 (CI) (D) 電子撞擊法 (EI)
28. 下列何者非毛細管電泳帶加寬的原因？
(A) longitudinal diffusion (B) Joule heating
(C) injection plug length (D) mass transfer
29. 關於番瀉之敘述，下列何者錯誤？
(A) 為蓼科植物 (B) 基原植物為 *Senna alexandrina* Mill.
(C) 主要活性成分為 sennosides A 和 B (D) 其莢果 (pods) 亦含瀉下成分
30. 下列有關生藥之敘述，何者錯誤？
(A) German chamomile 又稱為 *matricaria* (B) valerian 可用於抗焦慮
(C) forskolin 可活化 *adenylate cyclase* (D) ginkgolides 可活化 *platelet-activating factor*
31. 下列何者最不常用 AAS 進行分析？
(A) 電解質輸注液中鈉與鉀的含量分析 (B) 蔗糖中鉛的限量分析
(C) 多元醇中鎳的限量分析 (D) 胰島素中鋅的限量分析
32. 有關紅外光光譜法的敘述，下列何者錯誤？
(A) 固體樣品可以製成溴化鉀盤進行測定 (B) 可以測定氣體樣品
(C) 吸收光譜無法轉換成穿透光譜 (D) 減弱總反射 (ATR) 技術可用於測試高濃度成分
33. 將每錠標稱含量為 40mg 之 furosemide，經萃取稀釋後配製成濃度預期為 1mg/100 mL 之檢品，於 271nm 下測得其吸光度值為 0.45，已知 furosemide 之 A (1%, 1cm) 為 500，則此錠劑之實際含量百分比為多少？
(A) 80 (B) 90 (C) 95 (D) 100
34. 毛細管電泳系統中，在何種 pH 值之緩衝液下，其電滲透流 (EOF) 最大？
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8
35. 下列何種中藥，其主成分化學結構不屬於黃酮類？
(A) *Puerariae Radix* (B) *Citri Reticulatae Pericarpium*
(C) *Gardeniae Fructus* (D) *Sophorae Flos et Flos Immaturus*
36. 有關各種計量單位之敘述，下列何者錯誤？
(A) 「percent weight in volume」正確單位可表示為 g/100 mL
(B) 「比重」正確單位可表示為 g/L
(C) 1 pint 液體體積比 0.1 gallon 大
(D) 1 pound 物質比 10 ounce 重
37. 依中華藥典，有關錠劑之敘述，下列何者錯誤？
(A) 壓製錠之製造法中，利用適當黏合液，經混合控壓處理者，屬濕式顆粒法
(B) 常見滑潤劑多屬疏水性，過量使用會影響溶離表現
(C) 乾燥黏合劑中之微晶纖維素，常用於直壓錠之製造
(D) 當藥用成分為疏水性時，由生體可用率考量，建議使用疏水性稀釋劑
38. 有關滅菌方法之敘述，下列何者錯誤？
(A) 油質溶液可用乾熱滅菌，在 100°C 加熱 30 分鐘達滅菌確效
(B) 過濾滅菌可在室溫下進行
(C) 玻璃器皿可透過蒸氣滅菌，在 121.5°C 加熱 20 分鐘達滅菌確效
(D) 環氧乙烷可用於氣體滅菌法
39. 依中華藥典，Neomycin Sulfate and Prednisolone Acetate Ophthalmic Suspension 應採用何種無菌試驗法？
(A) 微孔濾膜過濾法 (B) 直接接種法
(C) 細胞表面抗原檢測法 (D) 血瓶微生物培養法
40. 有關口服延釋 (extended-release) 劑型之敘述，下列何者最適當？
(A) 延釋劑型可減少給藥次數，並且有助於提高劑量調整之彈性
(B) 延釋劑型通過胃腸道時間之快慢，並不影響藥品之釋放與吸收
(C) 理想的口服延釋劑型，藥品釋放通常遵循 Michaelis-Menten 動力學模式
(D) 藥品水溶解度佳且在胃腸道具均一吸收之特性，為製備成延釋劑型藥品條件之一

41. 有關各種不同溶液劑之敘述，下列何者錯誤？
(A) 酊劑與芳香水劑均為含有芳香性或揮發性物質之溶液
(B) 酊劑與流浸膏劑之主要活性成分均僅由植物抽提而得
(C) 糖漿劑與醃劑均為含有甜味劑之溶液
(D) 流浸膏劑與酊劑均為含有乙醇之溶液
42. 有關凝膠劑 (gel)，下列敘述何者錯誤？
(A) 為半固體製劑
(B) 由無機小粒子或有機大分子所組成
(C) 可能具有搖變性 (thixotropy)
(D) 僅供局部外用
43. 依中華藥典，下列何者為單軟膏之主要成分？
(A) 白蠟
(B) 白軟石蠟
(C) 黃蠟
(D) 羊毛脂
44. 下列注射途徑中，何者可容許之注射體積最少？
(A) 靜脈注射
(B) 肌肉注射
(C) 皮下注射
(D) 皮內注射
45. 依中華藥典，注射劑中「熱原試驗」和「細菌內毒素試驗」之敘述，下列何者錯誤？
(A) 熱原試驗為檢測家兔發熱反應
(B) 所有的注射劑皆可用熱原試驗證明完全無熱原
(C) 細菌內毒素試驗是用Limulus amoebocyte lysate (LAL) 檢測
(D) Limulus amoebocyte lysate (LAL) 試驗較靈敏且是定量性的方法
46. 下列何者不做為抗氧化劑使用？
(A) sodium metabisulphite
(B) sodium sulphite
(C) sodium stearate
(D) ascorbic acid
47. 靜脈營養輸液要由周邊靜脈給與時，其osmolarity容許的上限為多少mOsm/L？
(A) 300
(B) 900
(C) 1,200
(D) 2,000
48. 下列何者不是藥品使用評估 (drug use evaluation) 之主要參考資訊？
(A) 醫療機構內相關藥品之購買紀錄
(B) 相關藥品之溶離率曲線比對報告
(C) 醫療機構內相關藥品之使用量
(D) 醫療機構內相關藥品之開方紀錄
49. 下列何者最不會導致老年人尿失禁的惡化？
(A) donepezil
(B) furosemide
(C) lisinopril
(D) solifenacin
50. 下列何者是影響藥師提供patient-centered care成效之因素？①病人的文化②照顧者的社經地位③health-information technology之進步④將藥師納入跨領域團隊照護系統
(A) 僅①②
(B) 僅③④
(C) 僅②③④
(D) ①②③④
51. 有關influenza抗病毒藥品，下列敘述何者正確？
(A) amantadine 為M2 ion channel inhibitor，可用以治療influenza B virus感染
(B) baloxavir 為Cap-dependent endonuclease inhibitor，可用於12歲以下兒童，僅需1次劑量
(C) 因influenza重症而住院的病人即使發病時間超過48小時，仍應給與neuraminidase inhibitors
(D) zanamivir inhalation 不建議使用於暴露後預防influenza
52. 江先生是計程車司機，這幾天因有感冒流鼻涕症狀而到社區藥局選購指示藥品。藥師應建議下列何項藥品？
(A) chlorpheniramine
(B) diphenhydramine
(C) hydroxyzine
(D) loratadine
53. 下列何種高血壓的病人，血壓控制目標最適合設定為130/80 mmHg？
(A) 正在洗腎室準備進行血液透析的病人
(B) 每24小時urine albumin excretion $\geq$ 30 mg的糖尿病病人
(C) 單次門診血壓測量為145/95 mmHg的失智症老年人
(D) 在安養機構的85歲老年人
54. 劉太太有gout病史，最近被診斷hypertension，下列何項藥品最可能增加其blood uric acid濃度？
(A) amiloride
(B) triamterene
(C) hydrochlorothiazide
(D) spironolactone
55. 陳小姐入院治療，檢驗數值如下：Na 138 mEq/L、K 2.5 mEq/L、Cl 92 mEq/L、pH 7.49、PaCO₂ 46 mmHg、HCO₃⁻ 34 mEq/L、Urine Cl 8 mEq/L，下列治療何者最不適當？
(A) acetazolamide
(B) furosemide
(C) potassium chloride
(D) sodium chloride

56. 小明藥師開設藥局，並找了藥劑生大明一同經營，下列敘述何者錯誤？
(A) fentanyl只有小明可調劑，且只能調劑一次
(B) tramadol只有小明可調劑，且要注意處方箋上是否載有管制藥品使用執照號碼
(C) zopiclone大明可調劑，且本藥品不須使用管制藥品專用處方箋
(D) zolpidem大明、小明皆可調劑，本處方箋應妥善保存5年
57. 下列有關藥師懲戒委員會之敘述，何者錯誤？
(A) 藥師懲戒委員會之委員，應就不具民意代表身分之藥學、法學專家學者及社會人士遴聘之，其中法學專家學者及社會人士之比例不得少於三分之二
(B) 藥師懲戒委員會由中央或直轄市、縣（市）主管機關設置
(C) 藥師懲戒委員會應將移付懲戒事件，通知被付懲戒之藥師，並限其於通知送達之翌日起二十日內提出答辯或於指定期日到會陳述；未依限提出答辯或到會陳述者，藥師懲戒委員會得逕行決議
(D) 被懲戒人對於藥師懲戒委員會之決議有不服者，得於決議書送達翌日起二十日內，向藥師懲戒覆審委員會請求覆審
58. 依據藥事法，對於藥商的管理規定，下列敘述何者正確？
(A) 藥商申請停業，應將藥商許可執照及藥物許可證隨繳當地衛生主管機關，每次停業期間最長不得超過半年
(B) 民國82年2月5日前列冊登記之中藥商，得從事非屬中醫師處方藥品之零售業務
(C) 藥商持有經中央衛生主管機關公告為必要藥品之許可證，如有無法繼續製造、輸入或不足供應該藥品之虞時，應至少於三個月前向中央衛生主管機關通報
(D) 凡取得藥師執照者，即可於中藥製造業擔任駐廠監製藥師
59. 高博士與其研發團隊開發出治療心臟病之處方藥順利上市，有關藥事法對於此藥品廣告之規定，下列敘述何者錯誤？①得藉採訪或報導開發過程為宣傳 ②藥品廣告核准之有效期間是一年 ③不得於廣播及電視廣告 ④高博士可用個人名義向衛生單位申請藥品廣告
(A) 僅②③ (B) ①②③ (C) ②③④ (D) ①④
60. 依據輸入醫療器材邊境抽查檢驗辦法，下列何者無須實施邊境查驗？
(A) 衛生套（保險套） (B) 耳溫槍
(C) 一般醫用口罩 (D) COVID-19家用型抗原檢測試劑
61. 某一工廠未取得製造業藥商許可執照及藥品許可證情形下私自製造藥品，該藥品屬藥事法所稱之？
(A) 劣藥 (B) 偽藥 (C) 禁藥 (D) 以上皆非
62. 藥事法第8條有關製劑分為下列那幾項？①醫師處方用藥 ②醫師藥師藥劑指示藥品 ③成藥 ④中藥 ⑤固有成方製劑
(A) ①②③④⑤ (B) ①②③④ (C) ①②③ (D) ①②③⑤
63. 醫療器材依風險程度，分幾級？
(A) 三 (B) 四 (C) 五 (D) 六
64. 管制藥品販賣業者每隔多久需申報管制藥品簿冊登載情形？
(A) 每週 (B) 每月 (C) 每季 (D) 每年
65. 醫療機構或藥局調製藥品，應就下列事項，採取相關措施：
(A) 調製人員之安全防護 (B) 調製錯誤之防範
(C) 交叉污染之防範 (D) 以上皆是
66. 已變質、逾保存期限或下架回收之藥品，未明顯區隔置放，依藥事法處罰鍰？
(A) 新臺幣3萬元以上100萬元以下 (B) 新臺幣3萬元以上200萬元以下
(C) 新臺幣3萬元以上500萬元以下 (D) 新臺幣3萬元以上2000萬元以下
67. 管制藥品的單據及管制藥品專用處方箋，均應保存幾年？
(A) 3年 (B) 5年 (C) 6年 (D) 10年
68. 藥品第一級回收作業，藥品製造或輸入業者應於幾個月內完成？
(A) 1個月 (B) 2個月 (C) 3個月 (D) 6個月
69. 某流感快篩的敏感度為60%，特異度為70%，對發燒病人篩檢的陰性預測值為80%，此流感快篩之陰性反應的人中估計得到流感的百分比為多少？
(A) 40% (B) 30% (C) 20% (D) 無法判斷

70. 關於麻疹 (Measles) 的敘述，下列何者最適當？
 (A) 其致病原麻疹病毒屬黏液病毒 (Myxovirus)
 (B) 麻疹病毒之基因體為八段單股的 RNA
 (C) 麻疹病毒具有多種血清型
 (D) 病毒感染時，體內T細胞會攻擊被病毒感染的上皮細胞，造成病人身上的大塊紅斑 (maculopapular measles rash)
71. 超級抗藥性結核菌 (extensively drug-resistant TB, XDR-TB) 的定義是多重抗藥性結核菌 (multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis, MDR-TB)，除對卡納黴素 (kanamycin)、阿米卡星 (amikacin) 與捲曲黴素 (capreomycin) 三種藥物中任一種具有抗藥性，且對下列那一類藥物具有抗藥性？
 (A) 他唑巴坦 (tazobactam) (B) 伊曲康唑 (itraconazole)
 (C) 氟喹諾酮 (fluoroquinolone) (D) 米替福新 (miltefosine)
72. 有關水痘病毒的敘述，下列何者最不適當？
 (A) 水痘病毒會復發 (reactivation)，但終身只會得到一次帶狀疱疹
 (B) 有治療水痘病毒感染的抗病毒藥物
 (C) 有水痘病毒疫苗
 (D) 潛伏在神經細胞中
73. 病原菌感染時，在感染處引起先天性免疫發炎反應，吸引下列何種血液中的免疫細胞最快來到感染處？
 (A) B 細胞 (B) NK 細胞
 (C) 嗜中性白血球 (D) CD8 毒殺 T 細胞
74. 肺結核是由 Mycobacterium tuberculosis 感染後引起的慢性傳染病。下列何者是造成該細菌長期潛伏於被感染的細胞內的最主要因素？
 (A) 複製繁殖力高
 (B) 抵抗吞噬體的作用 (C) 抑制樹突細胞抗原呈獻
 (D) 抗原變異性大
75. 白喉桿菌可為生物氣膠而導致疾病發生，主要的機制為何？
 (A) 桿菌對寄主的侵襲力 (B) 桿菌對寄主的過敏性
 (C) 桿菌內毒素毒性影響 (D) 桿菌外毒素毒性影響
76. 關於B型肝炎病毒 (Hepatitis B virus)，下列敘述何者最不適當？
 (A) HBeAg 是病毒包膜糖蛋白 (envelope glycoproteins)
 (B) HBcAg 是病毒核衣殼蛋白 (nucleocapsid protein)
 (C) HBx 有轉錄反式活化因子 (transcriptional transactivator) 功能
 (D) HBV polymerase (Pol) 具有反轉錄酶活性 (reverse transcriptase activity)
77. 某採購案規格書內容過於籠統，導致投標廠商認知差異甚大。此情形最可能出現什麼現象？
 (A) 投標廠商增加 (B) 履約爭議提升
 (C) 預算降低 (D) 驗收更快速
78. 關於物品報廢手續，下列敘述何者錯誤？
 (A) 物品於核准報廢前，應予以妥善保管，不得毀棄
 (B) 物品報廢單應經申請報廢單位之主管核准後，連同報廢物品送交物品管理單位點收
 (C) 物品即使核准報廢，也不得變賣
 (D) 物品報廢經核定後，應在物品帳內，予以註銷
79. 某機關採統包方式辦理校門口意象及綠美化工程採購，總金額為新臺幣98萬元，下列何者不是得採行之招標方式？
 (A) 公開取得企劃書
 (B) 依採購法第22條第1項第9款辦理公開評選
 (C) 公開招標
 (D) 依中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第2款辦理限制性招標
80. 某工程採購案於開標後發現最低標廠商報價明顯低於市場行情，機關合理懷疑其履約能力。依政府採購法規定，機關正確處理方式為何？
 (A) 直接決標以免延誤 (B) 逕行廢標
 (C) 要求最低標廠商提出說明 (D) 改由次低標得標