

B、C 型肝炎防治

- 1.() 血中 B 型肝炎表面抗原 (HBsAg) 呈現陽性反應，六個月再驗仍為陽性者即稱為 B 型肝炎帶原者。
(A) 是 (B) 不一定 (C) 否 (D) 6 個月後再驗一次
- 2.() 急性病毒性 B 型肝炎潛伏期為 15 至 50 天，平均為 28.30 天。
(A) 是 (B) 否 (C) 30 天 (D) 25 天
- 3.() 下列哪些對象為慢性病毒性 C 型肝炎之高危險群體？
(A) 受血者 (B) 靜脈注射毒癮者 (C) 洗腎者 (D) 以上皆是
- 4.() 92 年 10 月我國開始推動『全民健保加強慢性 B 型及 C 型肝炎治療試辦計畫』，由中央健保局投入龐大預算，治療 B、C 型肝炎感染之患者。
(A) 是 (B) 否，由行政院疾病管制局
(C) 否，由行政院衛生署 (D) 否，由衛生局
- 5.() B 型肝炎表面抗體陽性(Anti-HBs)，表示體內有保護性抗體。
(A) 是 (B) 要觀察六個月以上
(C) 一個禮拜後就產生抗體 (D) 以上皆非
- 6.() 目前政府常規性 B 型肝炎疫苗(基因型) 接種，其第 2 劑接種時程為何？
(A) 出生滿 1 週 (B) 出生滿 2 週
(C) 出生滿 1 個月 (D) 出生滿 6 個月
- 7.() C 型肝炎係由糞口感染，建議飲食上需注意熟食避免喝生水。
(A) 是 (B) 不是，血液傳輸
(C) 不是，刺青跟糞口傳染皆會 (D) 以上皆非
- 8.() B 型肝炎表面抗體陽性(Anti-HBs)，表示體內沒有保護性抗體，需注射 B 型肝炎疫苗。
(A) 否 (B) 是 (C) 不一定
- 9.() 如何預防 B 型肝炎？
(A) 接種 B 型肝炎疫苗 (B) 養成良好的衛生習慣
(C) 避免不必要的輸血 (D) 以上皆是
- 10.() B 型肝炎帶原者，建議每 6 個月定期抽血接受肝功能檢驗，以確保肝指數是否於正常值，若發現肝指數上升，及早發現及早治療
(A) 是
(B) 否，每年做一次就可以了
(C) 否，不用定期做健康檢查
(D) 以上皆非

答案：1.A 2.A 3.D 4.A 5.A 6.C 7.C 8.A 9.D 10.A