

急性病毒性 D 型肝炎 (Acute Hepatitis D)

一、臨床條件

個案為 B 型肝炎帶原者，且經醫師臨床診斷為急性 D 型肝炎。
並同時具有下列二項條件：

- (一) 出現急性發作症狀：包括發燒、全身倦怠、噁心、嘔吐、腹部不舒服等。
- (二) 黃疸或 ALT 上升。

二、檢驗條件

血清學 B 型肝炎表面抗原 (HBsAg) 及 D 型肝炎 IgM 抗體 (IgM anti-HDV) 檢測陽性。(急性 D 型肝炎檢驗部分送疾病管制署確認)

三、流行病學條件

個案為 B 型肝炎帶原者，並具有下列任一個條件：

- (一) 與 D 型肝炎個案性行為或血體液接觸。
- (二) 使用受 D 型肝炎病毒所污染之注射器、針頭、針灸紋眉、穿耳洞、刺青等器具。
- (三) 與 D 型肝炎感染者共用刮鬍刀、牙刷等行為。
- (四) 與經實驗室證實之確定病例具有流行病學之關聯。

四、通報定義

符合臨床條件、檢驗條件及流行病學條件任一者。

五、疾病分類

- (一) 可能病例：
NA

- (二) 極可能病例：
NA

- (三) 確定病例：
符合臨床條件及檢驗條件。

六、檢體採檢送驗事項

採檢項目	檢體種類	採檢目的	採檢時機	採檢規定	運送條件	注意事項
急性病毒性肝炎 (除 A 型外)	血清	抗體檢測	立即採檢	以無菌試管收集 3 mL 血清。	低溫	1. 檢體勿加入任何添加物。 2. 血清檢體見 2.8.3 及 2.8.4 備註說明，血清採檢步驟請參考第 3.3 節。