

麻疹防治 VS. MMR疫苗 (麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗)



遠離「麻」煩事!

★ 請留意以下疑似症狀：




發燒



鼻炎



紅疹



結膜炎



咳嗽

★ 接觸者注意事項



1. 落實自主健康管理18天
2. 避免接觸1歲以下嬰兒、幼童、病人及孕婦
3. 避免出入公共場所、盡量佩戴口罩
4. 出現疑似症狀，勿自行就醫，請聯繫所在地衛生局(所)，由衛生人員協助安排就醫。

預防麻疹這樣做

① 接種MMR疫苗(麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗)

接種疫苗可以增加病毒感染的抵抗力，建議1歲以上及國小入學前幼童，依疫苗接種時程儘快接種疫苗，以提升保護力。

② 保持良好的個人衛生，進出公共場所或人多的地方務必戴口罩，並注意呼吸道及手部衛生，如出現疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊史及暴露史。

MMR接種對象

12個月
第1劑

1歲至入學前幼兒(公費)

免費提供MMR疫苗2劑
(1歲&滿5歲後各1劑)

其他對象(自費)

逕至各醫療院所
自費接種
(近期有前往麻疹
或德國麻疹流行
地區規劃)

5歲至入學前
第2劑

15-49歲育齡婦女(公費)

憑德麻抗體陰性證明，
免費提供MMR疫苗1劑

本市自費MMR疫苗訊息專
區<https://reurl.cc/v0bg9l>

15-49歲
育齡婦女



15-49歲育齡婦女MMR公費對象

本國籍

- 一般育齡婦女：檢具**近 3 個月內之德國麻疹抗體呈陰性或未確定者**報告。
- 產後補種：婦女若於懷孕期間經檢測**未具德國麻疹抗體**，請於產後**持該胎次產檢日起之2年內德國麻疹抗體檢驗報告**。

外國籍 配偶

- 針對來台申請居留或定居而無德國麻疹相關疫苗接種證明者，或經檢測不具德國麻疹抗體出具證明者

- ◆ 接種地點：本市各衛生所
- ◆ 德國麻疹抗體報告：育齡婦女自行至有提供德國麻疹抗體檢驗之院所檢驗後提出
- ◆ 疫苗費用:免費