

附件 5

我國現行兒童預防接種時程

107.08 版

疫苗 \ 接種年齡	24hr 內 儘速	1 month	2 months	4 months	5 months	6 months	12 months	15 months	18 months	21 months	24 months	27 months	滿 5 歲至 入國小前	國小學童
B 型肝炎疫苗 (HepB)	第一劑	第二劑				第三劑 ⁵								
卡介苗 (BCG) ¹					一劑									
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗 (DTaP-Hib-IPV)			第一劑	第二劑		第三劑 ⁵			第四劑					
結合型肺炎鏈球菌疫苗 (PCV13)			第一劑	第二劑			第三劑							
水痘疫苗 (Varicella)						一劑								
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR)						第一劑							第二劑	
日本腦炎疫苗 (JE) ²							第一劑				第二劑		一劑 [*]	
流感疫苗 (Influenza) ³						← 初次接種二劑，之後每年一劑 →								
A 型肝炎疫苗 (HepA) ⁴							第一劑		第二劑					
白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 (DTaP-IPV)													一劑	

1.105年起，卡介苗接種時程由出生滿24小時後，調整為出生滿5個月(建議接種時間為出生滿5-8個月)。

2.106年5月22日起，改採用細胞培養之日本腦炎活性減毒疫苗，接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑。

*針對完成3劑不活化疫苗之幼童，於滿5歲至入國小前再接種1劑，與前一劑疫苗間隔至少12個月。

3.8歲(含)以下兒童，初次接種流感疫苗應接種2劑，2劑間隔4週。

4.A型肝炎疫苗107年1月起之實施對象為民國106年1月1日(含)以後出生，年滿12個月以上之幼兒。另包括設籍於30個山地鄉、9個鄰近山地鄉之平地鄉鎮及金門連江兩縣等原公費A肝疫苗實施地區補接種之學齡前幼兒。

5.106年5月1日起，以六合一疫苗暫用以取代嬰幼兒應接種之第3劑B型肝炎疫苗及五合一疫苗。

國小新生入學後預防接種紀錄檢查與補種指引

107年7月修訂

疫苗別	學前應完成劑數	新生查卡注意事項	補種建議		
卡介苗 (BCG)	1		無接種紀錄者安排補種		
			完成 ² 劑次	補種 劑次	補種時程 ¹
B型肝炎疫苗 (HepB)	3	接種六合一疫苗之劑次列入計算	0 1 2	3 2 1	0 → 1m → 6m 0 → 5m
小兒麻痺疫苗 (OPV/IPV)	4	1. 接種五合一或六合一疫苗之劑次列入計算 2. DTP/DTaP/Tdap 相關疫苗第4劑在4歲以後才完成接種,則滿5歲應接種之DTaP-IPV疫苗可不再接種。	0	4	DTaP-IPV ⇔ IPV ³ ⇔ IPV ⇨ IPV
			最近1劑 < 4歲		
			1 2 3	3 2 1	DTaP-IPV ⇔ IPV ³ ⇨ IPV DTaP-IPV ⇨ IPV DTaP-IPV
			最近1劑 ≥ 4歲		
白喉破傷風百日咳混合疫苗 (DTP/DTaP)	4	1. 接種五合一或六合一疫苗之劑次列入計算 2. DTP/DTaP/Tdap 相關疫苗第4劑在4歲以後才完成接種,則滿5歲應接種之DTaP-IPV疫苗可不再接種。	0	3	DTaP-IPV ⇔ DTaP-IPV ⇨ Td
			最近1劑 < 4歲		
			1 2 3	3 2 1	DTaP-IPV ⇔ DTaP-IPV ⇨ Td DTaP-IPV ⇨ Td DTaP-IPV
			最近1劑 ≥ 4歲		
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR)	2		0	2	MMR ⇨ MMR
			1	1	MMR
水痘疫苗 (Varicella)	1	已自然感染過水痘經醫師確診者無須再接補種	0	1	Varicella
日本腦炎疫苗 (JE) ⁴	2	已接種不活化日本腦炎疫苗者,依建議接續接種活性減毒疫苗	0	2	JE → JE
			1	2	→ JE → JE
	2	1	→ JE		
	3	1	→ JE		
4	經評估不適合接種活性減毒日本腦炎疫苗者 ⁵	1	1	→ JE	
		0	3	JE ⇨ JE → JE	
1	3	JE ⇨ JE → JE			
2	2	⇨ JE → JE			
3	1	→ JE			
白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 (DTaP-IPV)	1	使用於入學前滿5歲以上接種	0	1	DTaP-IPV

備註:

- 間隔2週, ⇨ 間隔1個月, ⇔ 間隔2個月, ⇨ 至少間隔6個月, → 與前一劑至少間隔12個月
- 從未接種或忘記有無接種各項疫苗者,完成劑次視為0。
- 如為OPV/IPV及DTP/DTaP/Tdap均未完成而需補種者,本劑應改接種DTaP-IPV/Tdap-IPV。
- 自106年5月22日起改採用細胞培養之日本腦炎活性減毒疫苗,應接種2劑,2劑至少間隔12個月。針對完成3劑不活化疫苗之幼童,於滿5歲至入國小前再接種1劑,與前一劑疫苗間隔至少12個月。
- 經醫師評估不適合接種活性減毒JE疫苗之孩童,衛生局/所有儲備不活化日本腦炎疫苗,可請院所協助申請。