

預防高處墜下 珍愛生命守門人







死?在它?


司馬遷:人固有一死,或重於泰山,或輕於鴻毛



3

docchi?







113年的總死亡人口數為201,383人

十大死因依序為:

- (1) 惡性腫瘤(癌症) 54,032人(26.8%)、(2)心臟疾病23,276人(11.6%)、
- (3)肺炎17,259人(8.6%)、(4)腦血管疾病12,463人(6.2%)、
- (5)糖尿病10,663人(5.3%)、(6)高血壓性疾病8,928人(4.4%)、
- (7)事故傷害6,924人(3.4%)、(8)慢性下呼吸道疾病6,193人(3.1%)、
- (9) 腎炎、腎病症候群及腎病變5,679人(2.1%)、

(10) 蓄意自我傷害(自殺)4,062人(2%)



使用適當名詞:鼓勵求助與討論

自殺想法自殺意念

自殺企圖自殺行為

自殺身亡

自傷想法自傷意念

自我傷害自傷行為

無自殺意圖之自傷

自殺行為之冰山模式



心理健康困擾

資料來源:張奕涵, et al., 台灣青少年自殺行為:近期趨勢 監測之啟示. 台灣公共衛生雜誌, 2023. 42(1):1-8



自殺的原因是多重的

沒有任何單一原因 可以解釋所有自殺

臺南市政府衛生局 關心您






依舊愛我



06352982(預約)







預防高處墜下 珍愛生命守門人





為什麼要預防?





因為高處墜下是





怎麼預防?



防制原理

- 1. 衝動:許多自殺行為是急性危機下的衝動行為。
- 2. 致命性:高致命性工具被限制後,即使自殺企圖者轉向低致命性的方法,死亡人數仍會減少。
- 3. 仿效:特定高致命性自殺工具被限制後, 死亡人數減少,較少被媒體報導,減少仿效行為。
- 父可以降低整個族群的風險,不需要高風險者的主動配合。分



許多自殺事件是衝動行為

Q:100個企圖自殺者,如果被救回,一年

之後再自殺而死亡的比例?

A: (1)50%(2)10%(3)5%(4)2%



企圖自殺的人被救回後,在一年之後,2%再次自殺死亡

雖2%,但已是一般人的100-200倍



臺南市政府衛生局

方法取代Means substitution


自殺從被限制的工具,轉向另一種方法

- 自殺危機歷時短暫
- 在困擾當中沒有多餘能力思考其他方法
- 轉往其他常見低致命方法,如服藥過量與割腕
- 及時獲得支持與治療,自殺衝動消除



從高致命方法轉向低致命方法(1/2)

高處墜下









臺南市政府衛生局


從高致命方法轉向低致命方法(2/2)





限制方法可以保護所有人

- 包括第一次企圖自殺者
- 包括未主動求助者
- 包括意氣用事/衝動者



臺南市政府衛生局

····防制墜落的方法

物質環境的限制改善高危地點的安全

- 高危地點的辨識
- 高危地點的安全

心理環境的限制 改善自殺的媒體報導 與戲劇呈現

- 上游:檢警消防
- 中游:媒體與影劇業者及創作者
- 下游:地方政府



····預防高危地點自殺····

- 1. 物理限制:可降低91-93%的風險,例如護欄
- 2. 鼓勵求助:可降低51-61%的風險,例如求助電話
- 3. 增加介入機會:可降低47%的風險,例如監視器





建物防墜措施

頂樓

- · 限制進入頂樓/監視器/紅外線警鈴 /警語
- 安全門連結物業 警報系統
- 加高女兒牆圍欄/ 隱形鐵窗

開放平台

- 安全網
- 隱形鐵窗

高樓窗戶

- 平開窗:窗檔
- 推射窗:安全 鍊
- 隱形鐵窗



預防高處墜下

····珍愛生命守門人····





···· 珍愛生命守門人 ····

一問

主動關懷

與

積極傾聽

二應

1 適當回應

與

支持陪伴

三轉介

資源轉介

與

持續關懷



心理健康急救行動計畫(MHFA)



(傾)接觸、評估和協助任何危 機批判的傾聽和溝通 給予支持和資訊 鼓勵適當的專業協助 鼓勵尋求其他支持



你我都可以是珍爱生命守門人



臺南市政府衛生局 關心您






依舊愛我



06352982(預約)





謝部縣

