

## 取針標準(附件五)

### 1. 確認取針

- 1.1 定時器響起時，醫護人員確認需取針之床位，並將定時器關閉。

### 2. 取乾棉球

- 2.1 以無菌技術，以長鑷子夾取無菌乾棉球若干顆，置於非慣用手。(以慣用右手施術為例，非慣用手即為左手。)

### 3. 通知患者

- 3.1 至需取針之患者床位並告知患者將進行取針動作。

### 4. 準備取針

- 4.1 將棄針筒移至患者附近平坦區域。(不要讓棄針筒傾倒。)

### 5. 確認取針數目

### 6. 出針

- 6-1 基本手法：搖、退、拔、捫。

(確認取針數目與施針數目相同。)

- 6.2 以慣用手分 2-3 次將針退至皮下，再以非慣用手持無菌乾棉球貼近針身，將針退出。

### 7. 棄針

- 7.1 將取出的針置入棄針筒，使用過棉球棄置於感染性廢棄物收集筒。
- (1. 如治療部位出現出血情形，則以乾棉球直接壓迫止血
- 2. 如治療部位出現血腫情形，則以乾棉球直接按壓血腫處五分鐘。
- 3. 如醫護人員發生針扎事件，可參閱員工因公受傷通報及處理作業辦法。)

### 8. 完成

- 8.1 告知病人取針完成。
- 8.2 請病患緩慢起身，確認無遺針、出血或暈針情形後，告知病人完成治療程序，可以離開診間。